

SYNTHESE DES OBSERVATIONS
ORNITHOLOGIQUES BRETONNES
ENTRE LES 16/7/2002 et 15/7/2003.
(SUITE ET FIN)

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*.

2 le 22 août à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22), 2 les 25 et 27 août au sémaphore de Brignogan-Plage (29), 3 le 24 octobre et 1 le 25 à Hoëdic (56), 1 le 27 octobre au sémaphore de Brignogan-Plage.

A Ouessant (29), 1 le 1^e septembre, puis le passage est noté du 5 octobre au 3 novembre avec un maximum de 8 le 27 octobre.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*.

L'espèce est régulièrement observée du 5 août au 10 octobre au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

A Ouessant (29), le passage est faible entre le 4 septembre et le 3 novembre.

1 le 30 septembre à Tréhiguiet/Pénestin (56), 1 le 21 octobre à Hoëdic (56) et 1 juvénile de forme sombre le 11 novembre au cap Fréhel (22).

Au printemps, 1 de forme pâle le 2 avril à la pointe Er Hourel/Locmariaquer (56).

LABBE A LONGUE QUEUE *Stercorarius longicaudus*.

1 le 7 septembre à Ouessant (29).

GRAND LABBE *Catharacta skua*.

L'espèce passe régulièrement du 7 août au 1^e décembre au sémaphore de Brignogan-Plage (29) où 8/1 h 30 sont observés le 2 janvier.

Le passage est observé à Ouessant entre le 27 août et le 4 novembre.

1 du 27 septembre au 10 octobre au lac de Grand-Lieu (44).

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*.

L'espèce est bien présente dans ses lieux classiques de rassemblement postnuptiaux mais est notée maintenant régulièrement un peu partout sur le littoral et en retrait.

Maximum : 850 à 900 oiseaux le 3 décembre et 519 le 4 à Beauport/Paimpol (22).

Reproduction.

25 couples se reproduisent sur le lac de Grand-Lieu (44).

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*.

A Ouessant (29), 5 le 11 septembre, l'espèce est ensuite régulière jusqu'au 4 novembre.

48/2 h le 10 octobre au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

Il faut ensuite attendre la mi-janvier pour retrouver une série d'observations : 16 le 11 à la pointe de Saint-Cast-le-Guildo (22), 65 le 13 à Ouessant, 15 à la mi-janvier à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (29), 140 le 29 à Martin Plage/Plérin (22).

Le mouvement de printemps se dessine en avril : 300 le 10 à Trunvel/Tréogat (29), 2 le 10 et 150 le 15 à Ouessant, 54 le 20 avril à Hoëdic (56).

MOUETTE DE SABINE *Larus sabini*.

6 le 23 août au large de Piriac-sur-Mer (44).

A Ouessant (29), 1 le 21 septembre et le 5 octobre, 3 le 12 octobre, 1 les 13 et 17, 5 le 22, 2 les 23 et 27 et 1 le 28 octobre.

Une donnée estivale en 2003 : 1 adulte le 30 juin à Trunvel/Tréogat (29).

MOUETTE DE FRANKLIN *Larus pipixcan*.

1 2^e hiver le 11 novembre au cap Fréhel (22).

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*.

A la mi-janvier, 38 523 en Loire-Atlantique et 9 297+ dans le Morbihan ; 2 000 en baie de Goulven (29) le 25 janvier.

Reproduction.

720 couples se reproduisent au lac de Grand-Lieu (44) en 2003.

GOELAND A BEC CERCLE *Larus delawarensis*.

1 le 14 septembre au Bronzais/Pénestin (56), 1 le 3 octobre à Bourienne/Langueux (22), 1 2^e hiver le 15 à l'étang du Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29), 1 1^e hiver du 8 novembre au 12 janvier à l'étang de Kerhuon/Le Relecq-Kerhuon (29), 1 le 17 novembre sur le parking du magasin Carrefour/Langueux, 1 adulte du 7 décembre au 20 février à Saint-Renan (29), 1 du 9 décembre au 25 février à Saint Anne la Palud/Plonévez-Porzay (29), 1 du 26 décembre au 14 février à l'écluse du Légué/Saint-Brieuc (22), 1 1^e hiver le 17 janvier et 1 adulte le 7 février au Kernic/Plounévez-Lochrist (29), 1 1^e hiver le 25 janvier et 1 adulte le 26 janvier à l'étang de Kerhuon, 1 adulte le 21 février à Guissény (29), 1 1^e hiver du 23 au 25 février à Saint-Lumine-de-Coutais (44), 1 1^e hiver du 24 février au 1^e mars à Douarnenez (29), 1 1^e été le 10 mars à Nérizelec/Plovan (29) et à Trunvel/Tréogat(29).

GOELAND CENDRE *Larus canus*.

1 330 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

9 le 15 juin à l'Île-Tudy (29).

L'espèce est notée dès juillet en baie de Saint-Brieuc (22).

GOELAND BRUN *Larus fuscus*.

900 le 19 août à Nérizelec/Plovan (29).

600 le 11 janvier au lac du Drennec/Sizun (29).

2 446 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Dpt	2003
Île des Landes	35	10
Baie de Morlaix	29	100
Île de Trévorc'h	29	103
Cap Sizun	29	94
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	15
Koh Kastell/Belle-Île	56	2 534

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*.

19 878 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Dpt	2003
Île des Landes	35	250
Baie de Morlaix	29	1 280
Île de Trévorc'h	29	199
Cap Sizun	29	256
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	219
Koh Kastell/Belle-Île	56	639

GOELAND LEUCOPHEE *Larus michaellis*.

1 le 11 août à la Tour des Anglais/Damgan (56) ; 1 les 21 et 30 août puis le 21 septembre à Bourrienne/Languieux (22) ; 1 2^e été, bague poussin en Camargue, le 8 septembre et 1 1^e été le 29 septembre à Ouessant (29) ; 1 le 15 octobre à Hoëdic (56).

1 le 8 janvier sur l'étang de Chalonge/Trébédan (22), 13 en Loire-Atlantique lors des comptages de la mi-janvier.

3 le 2 juillet à Landerneau (29).

GOELAND A AILES BLANCHES *Larus glaucoides*.

1 2^e été le 11 avril en baie du Kernic/Plounévez-Lochrist (29).

GOELAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*.

1 adulte le 2 janvier à Saint Pierre/Penmarc'h (29), 1 subadulte du 6 février au 16 mars à Ouessant (29), 1 le 7 février à Loc'h ar Stang/Tréogat (29), 1 2^e hiver le 2 mars dans le port du Guilvinec (29), 1 1^e hiver le 13 à Nérizelec/Plovon (29) et 1 adulte du 21 au 27 mars à Port à la Duc/Pléboulle (22).

GOELAND MARIN *Larus marinus*.

80 le 9 novembre en baie de Tresseny/Guissény (29).

Reproduction :

Nous indiquons les résultats, en nombre de couples, des recensements effectués en 2003 sur quelques colonies :

Colonies	Dpt	2003
Île des Landes	35	100
Baie de Morlaix	29	118
Réserve naturelle d'Iroise	29	129-130
Cap Sizun	29	31
Pen Men-Beg Melen/Groix	56	4
Koh Kastell/Belle-Île	56	4

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*.

230/3h30 le 27 octobre, 140/1h45 le 1^e décembre et 200/1h30 le 2 janvier au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Taux de succès
Cap Fréhel (22)	62	35	66%
Goulien (29)	282	300	24%
Pointe du Raz (29)	695	638	37%
Groix (56)	22+	23	82%
Belle-Île (56)	100	148	?
Total	1 160	1 144	

Cette espèce connaît en 2003 une légère progression. Des problèmes de prédation de la part de corvidés ou de laridés persistent.

STERNE CASPIENNE *Sterna caspia*.

1 le 10 septembre à Cancale (35).

STERNE A BEC ORANGE *Sterna bengalensis/elegans*.

1 le 17 août à Mesquer (44).

STERNE ELEGANTE *Sterna elegans*.

1 jusqu'au 31 juillet dans la colonie de Sternes caugek *Sterna sandvicensis* de l'île aux Dames en baie de Morlaix (29). Cet oiseau avait été bagué en 2001 au banc d'Arguin (33).

1 aux Glénan (29), à partir de la mi-mai.

STERNE HANSEL *Sterna nilotica*.

1 adulte le 22 août au lac de Grand-Lieu (44).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*.

Au mois de janvier, les effectifs minimum se répartissent comme suit :

35	22	29	56	44	Bretagne
?	14+	141+	25	42	222+

On note 227 le 13 mai en baie de Plouharnel (56) et 410 le 3 juillet à Roc'h Morhoc'h/Ploubazlanec (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
La Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22)	0	30	0
Trégor-Goëlo (22)	0	1-2	
Île aux Dames/Baie de Morlaix (29)	820	820	700
Archipel de Molène (29)	0	1	0
Île aux Moutons/Fouesnant (29)	933-942	526-560	680-700
TOTAL	1 754-1 763	1 308-1 393	1 381-1 401

L'augmentation des effectifs se poursuit. L'accroissement de la population est de 10,3 % par an depuis 1997.

La production globale, de 0,8 jeune/couple, est bonne est assez proche de la moyenne depuis 1996 (0,68 jeune/couple).

2 sites accueillent 99,9 % de la population.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougalli*.

4 adultes et 3 juvéniles le 15 juillet à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer(22), localité où l'espèce ne s'est pas reproduite en 2002, 2 le 22 à la grève des Courses/Languieux (22), 1 adulte et 1 subadulte le 26 à Iniz er Mour/Sainte-Hélène(56), 13 adultes et 7 juvéniles le 10 août à Pen an Toul/Larmor-Baden (56), 5 adultes et 2 juvéniles le même jour près de l'Île-d'Arz (56), 5 le 27 à l'île Berder/Larmor-Baden, 1 adulte et 1 juvénile le 25 août dans le port de Saint-Quay-Portrieux (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
Ile aux Dames/Baie de Morlaix (29)	72-80	70-80	70
TOTAL	72-80	72-83	70

L'île aux Dames accueille la totalité des effectifs de l'espèce en France.

L'érosion se poursuit.

La production est bonne avec 0,88-0,97 jeune/couple.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*.

840 en juillet en baie de Saint-Brieuc (22).

Premiers retours : 3 le 30 mars à la pointe du Jas/Plévenon (22).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Île aux Moines (35)	95	103
La Colombière/St-Jacut-de-la-Mer (22)	5-20	60-70
Île aux Dames/Baie de Morlaix (29)	90	75-80
Région des Abers (29)	17	7-12
Archipel de Molène (29)	114	71-91
Rade de Brest (29)	139-167	87-102
Trunvel (29)	20	26
Île aux Moutons/Fouesnant (29)	121-124	122-129
Rivière d'Étel (56)	180	100
Golfe du Morbihan (56)	109-128	110
Marais salants de Guérande (44)	70	72
Lac de Grand-Lieu (44)	34	-
TOTAL	1 286-1 355	1 146-1 213

Les effectifs sont en légère progression par rapport à 2002. Le taux d'accroissement est de 7,9 % par an depuis 1999 et la population atteint son meilleur niveau depuis les années 60.

Sur l'île de Béniguet (29), les premières pontes s'étalent du 26 mai au 18 juin, alors que des pontes tardives ont encore lieu début juillet.

Seuls 13 % des effectifs français nichent sur des îlots marins.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*.

Il n'y a pas de donnée relative à la reproduction.

Par ailleurs, l'espèce est peu notée, peut être par manque d'attention, en migration post-nuptiale.

2 oiseaux sont notés les 22 et 24 octobre à Hoëdic (56).

STERNE DE FORSTER *Sterna forsteri*.

1 du 10 janvier au 11 mars dans l'estuaire de la Penzé (29) et en baie de Morlaix (29).

STERNE BRIDEE *Sterna anaethetus*.

1 adulte le 4 août à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22).

STERNE NAINNE *Sterna albifrons*.

La migration postnuptiale commence début août : 2 le 11 à la Tour des Anglais/Damgan (56), 2 le 12 à Brignogan-Plage (29), 6 le 13 et 3 le 22 en baie de Goulven (29), 1 le 25 août à la brèche de Trunvel/Tréogat (29), 1 juvénile le 30 septembre en baie de Goulven, 1 juvénile le même jour à Tréhiguier/Pénestin (56).

5 le 15 avril et 3 le 4 juin à Trunvel/Tréogat, 28 le 5 mai sur l'île de Sein (29), 2 le 17 mai en baie de Goulven, 1 le 8 juin à proximité de la colonie de Sternes Pierregarin *Sterna hirundo* d'Iniz er Mour/Sainte-Hélène (56), 3 le 8 juin à Roc'h ar Hon/Lézardrieux (22), 28 le 12 juillet au sillon de Talbert/Pleubian (22), 2 le 15 juillet à la Colombière/Saint-Jacut-de-la-Mer (22).

Les observations estivales sont principalement effectuées à proximité de colonies de sternes d'autres espèces, probablement par attractivité.

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002	Jeunes à l'envol
Sillon de Talbert & Ile d'Ollone (22)	30-36	19-27	0
Béniguet/Archipel de Molène (29)	34-35	7-16	20
Île de Sein (29)	1+	3	0
TOTAL	65-72	29-46	21

Les effectifs augmentent de manière spectaculaire par rapport à l'an passé. La reproduction échoue totalement sur le sillon de Talbert.

L'espèce est coutumière de ces fluctuations d'effectifs mais reste fidèle à ses sites de reproduction.

La production globale est moyenne avec 0,29-0,28 jeune/couple.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*.

1 oiseau de 1^e été le 8 juillet à l'étang de Saint-Jean/Locoal-Mendon (56).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Lac de Grand-Lieu (44)	601-642	486

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*.

Un petit passage est noté au sémaphore de Brignogan-Plage (29) et à Guissény (29) de fin août à la mi-septembre.

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Lac de Grand-Lieu (44)	128-141	26

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*.

1 juvénile les 30 et 31 août à Plonéour-Lanvern (29).

Le reste des observations provient du lac de Grand-Lieu (44) : 1 juvénile du 3 au 10 septembre, 2 juvéniles le 6 septembre et 1 adulte le 19 mai.

ALCIDES SP *Uria aalge/Alca torda*.

450 le 3 novembre, 500/1h45 le 1^e décembre et 350/1h30 le 2 janvier au sémaphore de Brignogan-Plage (29).

GUILLEMOT DE TROIL *Uria aalge*.

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Cézembre (35)	1-3	<10
Cap Fréhel (22)	227-233	200
Sept-Îles (22)	10	7
Roches de Camaret (29)	5+	+
Goulien (29)	20	22
TOTAL	263-271	250

La colonie du cap Fréhel accueille toujours la majorité des effectifs de la population du golfe normando-breton. Les effectifs bretons continuent leur progression.

PINGOUIN TORDA *Alca torda.*

A la mi-janvier, 353 en baie de Douarnenez (29) et 303 en rade de Brest (29).

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Cézembre (35)	2	2
Cap Fréhel (22)	8+	8-9
Sept-Îles (22)	21	21
TOTAL	31+	31-32

La légère progression des effectifs en 2002 et 2003 pourrait provenir d'apports des populations britanniques qui semblent en augmentation.

MERGULE NAIN *Alle alle.*

1 le 28 octobre et 1 le 7 novembre à Ouessant (29), 1 le 17 novembre à Quiberon (56), 1 le 26 novembre dans un jardin à Plouaret (22), 1 du 24 au 26 décembre à la grève du Vauglin/Planguenoual (22).

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica.*

Reproduction :

En nombre de couples :

Sites	Effectifs 2003	Effectifs 2002
Sept-Îles (22)	140	181-182
Baie de Morlaix (29)	2-3	3-4
Keller/Ouessant (29)	2-4	5-6
TOTAL	144-147	189-192

La population de l'île Rouzic, dans l'archipel des Sept-Îles (22) poursuit son déclin. Cette diminution est due à une compétition interspécifique avec le Puffin des anglais *Puffinus puffinus* pour les sites de nidification.

L'espèce est notée à 22 reprises à Ouessant (29) lors du passage d'automne : 26/12h le 10 septembre, 6/3h le 11, 40/5h20 le 13, ..., 11/5h40 le 1^e novembre.

Toujours à Ouessant, 5 sont observés le 30 avril et 1 le 13 mai.

PIGEON BISET *Columba livia.*

R.A.S..

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas.*

A la fin de l'été 2002, des indices de nidification probable sont relevés à Bréhat, Plounévez-Moëdec, Trémel (22), Garlan, Plouézoc'h, Plounéour-Ménez et Taulé (29).

On retient notamment 1 juvénile le 27 juillet à Lann Plumelin/Plumelin (56) et 1 individu sortant d'un terrier de lapin le 23 août sur un îlot proche de Béniguet/Bréhat (22).

Un passage faible est noté sur Ouessant (29) du 5 octobre au 10 novembre et à Hoëdic (56) du 13 au 24 octobre.

Peu de groupes hivernaux sont notés : 100 le 28 janvier à Peumerit (29) et 60 le 25 février à Ploudaniel (29).

En 2003, des indices de reproduction sont obtenus sur les communes suivantes : Bazouges-la-Pérouze, Fougères, Liffré (35), Calanhel, Plounévez-Moëdec, Trébédan, Trémel (22), Brignogan-Plage, Commana, Goulven, Guissény, Hanvec, La Feuillée, Lampaul-Guimiliau, Le Faou, Morlaix, Pleyber-Christ, Ploudiry, Plouézoc'h, Plougasnou, Plouider, Plounéour-Ménez, Saint-Goazec, Saint-Martin-des-Champs, Scrignac, Sizun, Trémaouézan (29), Baud, Camors, Guilligomarc'h, Hennebont, Inzinzac-Lochrist et Plumelin (56).

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*.

Des groupes de quelques dizaines d'individus sont signalés en août et septembre, mais il faut attendre octobre et surtout novembre pour voir défiler des bandes plus importantes dans l'Est de la région : 95 le 29 octobre à Trélivan (22), 640 le 11 novembre à Pacé (35), 250 le 12 à Sérent (56).

En décembre : 800 le 8 à La Bazouge-du-Désert (35), 1 000 le 15 à Bazouges sous Hédé/Hédé (35), 400 le 23 à Campénéac (56), 500 à Gueltas (56) et 500 à Locmariaquer (56) le même jour, un dortoir de 2 500 le 7 janvier à Languéan (22), 450 le 2 février à Camors (56), 250 le 13 à Trémel (22)...

Au printemps, l'espèce est trouvée nicheuse à Hoëdic (56) et dans l'archipel des Glénan, au Loc'h/Fouesnant (29).

1 juvénile le 4 avril à Brandivy (56).

TOURTERELLE TURQUE *Streptotelia decaocto*.

En septembre et octobre, plusieurs rassemblements sont notés : 43 le 12 septembre à Baud (56), 112 le même jour à Saint-Thuriau (56), 75 le 5 octobre à Lannilis (29), 64 le 15 octobre à Ouessant (29),...

TOURTERELLE DES BOIS *Streptotelia turtur*.

40 le 31 juillet à Ploeuc-sur-Lié (22), 25 le 24 août à Campénéac (56), 67 le 29 août à Baud (56). Puis 21 données sont recueillies en septembre et 5 en octobre : les dernières sont notées les 12 et 21 et 30 à Ouessant (29).

La première est vue le 10 avril à Hoëdic (56), ensuite des données sont recueillies le 15 à Iffendic (35), le 16 à Brignogan-Plage (29), le 17 à Saint-Jacut-de-la-Mer (22), le 22 à Vern-sur-Seiche (35).

20 du 16 au 18 mai à Hoëdic (56), 18 le 26 à Tréguennec (29), 6 le 9 juin à Saint Nicolas aux Glénan/Fouesnant (29), 16 le 13 au Conquet (29).

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*.

1 le 30 août à Erdeven (56) puis 2 individus, étonnamment synchrones, vus le 28 octobre à Cesson-Sévigné (35) et Brest (29).

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*.

1 le 18 avril à Donges (44).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*.

1 juvénile est nourri par une Grive musicienne *Turdus philomelos* le 24 juillet à Sarzeau (56), puis 5 individus sont signalés en août : le 1^e à Tréogat (29), le 6 à Ouessant (29), le 15 à Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), le 18 à Plouarzel (29) et le 28 à Goulien (29).

1 hâtif est le 14 mars à Grand-Lieu (44). Les premières départementales interviennent le 18 mars à Larmor-Baden (56), le 20 à Moëlan-sur-Mer (29) et le 23 à Plouézec (22).

Une seule forme rousse est signalée, à Lampaul-Ploudalmézeau (29). Le dernier chanteur est entendu le 19 juin.

A Grand-Lieu (44), 56 chanteurs sont dénombrés en 2003 sur 119 points d'écoute (47 points positifs).

CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba*.

Un seul cas de reproduction est signalé à la fin de l'été 2002, à Languidic (56)

14 cadavres sont notés.

En 2003, la nidification est notée au Cloître-Saint-Thégonnec et à Plougonven (29).

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua*.

Il y a plus d'informations (21 données) de juillet 2002 à janvier 2003 qu'en période de reproduction.

Les localités où l'espèce a été contactée en 2003 sont les suivantes :

- En Ille-et-Vilaine : Piré-sur-Seiche (2 juvéniles)
- Dans les Côtes-d'Armor : Louargat, Pleudihen-sur-Rance et Rospez (1 cadavre...).
- Dans le Finistère : Logonna-Daoulas (chanteur), Plouvorn et Tréguennec (couple). Dans le Haut-Léon, 25 cas de nidification sont enregistrés sur 36 sites occupés.
- Dans le Morbihan : Merlevenez et Nostang.

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*.

R.A.S..

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*.

A Ouessant (29), des isolés sont notés du 11 au 31 octobre.

Durant la saison de reproduction 2003, l'espèce est signalée dans les localités suivantes : **Etrelles** (35), **Guipavas**, **Hanvec**, Ouessant, **Plouénan**, **Plounéour-Trez**, **Scaër** (29), Camors, Locoal-Mendon (56) et Guérande (44).

Les communes indiquées en gras ont accueilli une reproduction certaine.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*.

Un afflux de Hiboux des marais est constaté en France en 2002-2003 et la région ne fait pas exception.

Les premiers sont vus à Sein (29) à partir du 27 août. Les observations de septembre concernent les Côtes-d'Armor (île Tomé, 2 ou 3 individus) et surtout le Finistère (Sein, baie d'Audierne, Ouessant).

En octobre, l'espèce est vue à l'unité le 4 à la Bosse-de-Bretagne (35), du 18 au 21 à Hoëdic (56). On note un maximum de 4 le 22 à Ouessant où le passage s'interrompt le 28 ; le lendemain, 1 est à Trielen/archipel de Molène (29).

En novembre et décembre, 6 ou 7 individus sont signalés hors Loire-Atlantique.

Un des faits marquants de l'hivernage est la concentration importante de l'espèce en Loire-Atlantique. Le pic est constaté en janvier ou février et atteint 208 individus (soit 32 % de l'effectif national). Les 7 dortoirs repérés se répartissent sur les communes de Belligné, Erbray, Mésanger, Pannecé, Saint-Herblon et Teillé. Ils accueillent de 30 à 65 individus (maximum le 23 février à Mésanger). De tels effectifs n'avaient jamais été atteints en France.

A Saint-Pabu (29), un dortoir est suivi d'octobre à mars et compte de 2 à 5 individus. Le dernier hivernant quitte le secteur dans la deuxième quinzaine d'avril.

Suite à cet afflux record, aucun indice de nidification n'est reporté, le dernier migrateur printanier est vu le 5 mai en baie de Goulven (29).

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*.

En fin d'été, l'espèce est contactée à Plougonven (29), Guillac, Locoal-Mendon et Plouhinec (56). Le dernier est le 21 septembre à Sarzeau (56).

Le premier est le 21 avril à Pont-Scorff (56).

Les localités occupées en 2003 sont :

Baulon, Guipry, Liffré (35), Trébédan (22), Botmeur, Brasparts, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plougonven, Pont-l'Abbé, Saint-Goazec, Saint-Rivoal, Scaër (29), Baud, Camors et La Vraie-Croix (56).

On note en particulier 4 à 5 chanteurs le 7 mai en forêt de Rennes/Liffré, 7 le 13 juin sur 2 sites à Guipry, 5 à 6 le 15 juin à Saint-Goazec. 4 et 2 couples sont notés respectivement au Cloître-Saint-Thégonnec et à Trébédan. Enfin, 2 œufs sont découverts le 12 juin dans une coupe à Scaër.

MARTINET NOIR *Apus apus*.

L'espèce est régulièrement notée durant le mois d'août avec par exemple 32 le 4 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35), 15 le 9 à Saint-Renan (29), 43 le 11 à Iffendic (35) et 70 le même jour à Erbrée (35), 18 le 17 à Bréhat (22), 22 le 27 à Séné (56).

En septembre, 5 données sont recueillies avec notamment 2 le 2 à Rennes (35), 1 le 21 à Penmarc'h et 1 le 29 à Batz (29).

Le dernier est vu le 16 octobre à Ouessant (29).

Les 2 premiers martinets sont vus le 10 avril à Redon (35) et à Trunvel/Tréogat (29). Ensuite, 1 le 13 à Hoëdic (56), 1 le 17 à Pleumeur-Bodou (22). Les premières bandes sont vues le 16 à Rennes, le 17 à Nantes (44), le 18 à Pont-l'Abbé (29), le 23 à Landerneau (29), le 26 à Saint-Brieuc (22)...

L'unique rassemblement printanier signalé concerne 400 individus le 29 avril à l'étang du Curnic/Guissény (29).

MARTINET RAMONEUR *Chaetura pelagica*.

1 individu aurait été vu le 2 octobre à Ouessant (29). Cette observation constituerait une première française mais elle n'a pas été soumise au C.H.N..

MARTIN-PECHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis*.

A Ouessant (29), 71 observations sont réalisées du 3 juillet au 5 novembre.

Des familles sont notées au Moulin à Marée/Lancieux (22) le 29 juillet et à l'étang de la forêt/Brandivy (56) le 3 août.

Au printemps 2003, la nidification est notée le 7 mai en forêt du Cranou/Hanvec (29), 1 couple nourrit 3 juvéniles le 31 mai à l'étang Marcel/Lamballe (22).

Par ailleurs, des observations en période de nidification sont faites à Careil/Iffendic (35) et au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29).

16 couples sont repérés à Grand-Lieu (44).

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*.

On note en fin d'été 58 le 17 août puis 21 le 21 à Saint Pierre/Penmarc'h (29), puis 1 du 1^e au 6 septembre à Ouessant (29).

Les 9 premiers sont le 3 mai à Saint Vio/Tréguennec (29).

En dehors de la baie d'Audierne, quelques oiseaux sont observés : 1 les 10 et 13 mai à Ouessant, 2 le 16 juin puis 1 le 10 juillet à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22) et 1 le 7 juillet à Saint-Joachim (44).

Au printemps, 18 à 20 couples sont recensés en baie d'Audierne dont 5 au moins se reproduisent.

HUPPE FASCIEE *Upupa epops.*

17 observations sont faites en fin d'été, 6 en août et 5 en septembre : 1 le 2 septembre sur l'île Tomé/Louannec (22), 1 le 7 à Ercé-en-Lamée (35), 1 le 28 à Sein (29) et 1 les 22 et 30 à Ouessant (29).

La première est le 26 février à Ouessant où l'espèce est contactée 7 fois du 18 au 26 mars. A Hoëdic (56), 5 individus passent entre le 2 mars et le 20 avril. Sur le continent, le dernier migrateur est le 21 avril à Briec-de-l'Odet (29).

Après le 1^e mai, la huppe est observée dans les localités suivantes : Argentré-du-Plessis (35), **Ercé-en-Lamée**, Guignen, **Le Sel-de-Bretagne**, **Teillay**, **Tresboeuf** (35), Penmarc'h (29), Camors (56) (en gras les communes où la nidification est certaine).

L'espèce n'est pas trouvée autour de Grand-Lieu.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla.*

Le premier migrateur, précoce, est le 22 juillet à Banneg/archipel de Molène (29). Il faut attendre le 17 août, avec 1 à Hoëdic (56), pour que les contacts deviennent réguliers. 8 observations sont faites en septembre et 5 en octobre.

Signalons les trois localités intérieures où l'espèce est notée : le 19 août à Pacé, le 24 à Lillion/Rennes (35) et le 1^e septembre à Poullaouen (29). Le maximum est de 4 individus à Sein (29) le 28 septembre.

A Trunvel/Tréogat (29), 3 individus sont capturés entre le 1^e septembre et le 10 octobre. Les derniers sont à Ouessant (29) les 16 et 18 novembre puis le 19 décembre, date très tardive.

Le printemps 2003 fournit trois observations : 1 le 17 avril à Ouessant, 1 le 21 à Plounéour-Trez (29) et 2 le 11 mai à Sougéal (35).

PIC CENDRE *Picus canus.*

Au printemps 2003, les contacts proviennent des forêts de Villecartier/Bazouges-la-Pérouse, de Fougères et de Rennes/Liffré (35).

PIC VERT *Picus viridis.*

R.A.S..

PIC NOIR *Dryocopus martius.*

L'espèce est bien notée même si elle est discrète le plus souvent. Près de la moitié des contacts sont des loges ou des traces si particulières. Elle peut être notée dans des parcs urbains comme à Hennebont (56) ou Morlaix (29).

Les données les plus occidentales sont recueillies dans le Pays bigouden (29), avec en particulier 1 à Trunvel/Tréogat les 26 juillet et 22 août, et dans le Léon (29), avec 1 les 31 janvier et 6 février (avec chant) à Lanildut.

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*.

R.A.S..

PIC MAR *Dendrocopos medius*.

Nous donnons à la suite les localités où l'espèce a été contactée :

forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouze, forêt de Fougères, étang de Bazouges sous Hédé/Hédé, forêt de Rennes/Liffré, forêt de Chevré/La Bouëxière & Châteaubourg, forêt de Paimpont (35), Coat Tromarc'h/Trémel, forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre, forêt de Coat an Hay/Louargat, bois de la Salle/Pléguen, forêt de Loudéac, château de Saint Aubin/Plédéliac, bois du Bosreux/Brusvily (22), forêt du Cranou/Hanvec & le Faou (29), forêt de Lanouée/Les Forges (56).

La donnée concernant 2 individus le 5 septembre à l'étang de l'Yaigne/ Châteaugiron (35) est étonnante.

Quelques données chiffrées : Villecartier (présence dans 3 parcelles), forêt de Rennes (présence dans 5 parcelles), Chevré (3 sites), Cranou (3 sites), Lanouée (7 couples).

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*.

R.A.S..

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla*.

Plusieurs observations concernant au moins 2 oiseaux sont faites à Ouessant (29) du 14 au 23 octobre.

Au printemps, 2 oiseaux sont repérés à Ouessant le 16 avril puis les 6 et 7 mai.

1 individu est vu à l'Île Grande/Pleumeur-Bodou (22) à une date étonnante : le 3 juillet.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*.

Deux données sont très étonnantes : 2 le 27 septembre à l'ancienne carrière des mines/Quily (56) et 1 le 1^e février à Saint-Lumine-de-Coutais (44).

Plus classique : 1 le 5 avril aux Landettes/Saint-Nazaire (44).

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*.

Un premier migrateur est le 5 septembre à Ouessant (29), localité où 5 observations sont réalisées ensuite du 13 au 31 octobre.

Le chant est entendu jusqu'au 28 octobre.

Peu de groupes sont notés en hiver : 16 le 30 décembre à Moréac (56), 15 le 14 janvier à Locoal-Mendon (56), 10 le 13 février à Locmariaquer (56).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*.

Le passage s'étale du 10 octobre au 5 novembre à Ouessant (29).

700 à Cancale (35) et 100 à Hoëdic (56) le 20 octobre, 400 à Saint-Caradec (22) le 7 janvier.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*.

Toutes les observations proviennent du secteur d'Hirel en baie du Mont-Saint-Michel (35). Le premier oiseau est détecté le 22 octobre. On note ensuite 4 le 24 novembre puis 10 le 30. Enfin, 6 individus sont suivis du 14 janvier au 8 février.

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*.

En fin d'été 2002, les sites de nidification suivants sont contrôlés : 12 cavités le 17 juillet aux grèves d'En Bas/Fréhel (22), 1 nid le 20 à l'Aber Wrac'h/Landéda (29), 2 ou 3 nids le 22 à Damgan (56), 1 ou 2 juvéniles le 28 à Primel/Plougasnou (29), 1 nid le 29 juillet à Gâvres (56), 1 juvénile nourri le 1^e août à Bréhat (22) et 1 autre le 16 août à Hoëdic (56). A la sablière de Quillan/Radenac (56), 3 nichées semblent toujours ravitaillées le 7 septembre.

Au même moment, des stationnements de migrateurs sont notés : 400 les 28 juillet et 8 août à Pen Mané/Locmiquélic (56), 400 le 11 août Careil/Iffendic (35), 500 le même jour à Paintourteau/Erbrée (35), 1 000 le 19 août au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern (29), 150 le 15 septembre au Curnic/Guissény (29), 1 000 environ le 29 septembre à la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (35).

Les premières sont vues le 6 mars à Trébeurden (22), le 8 à Poulguidou/Plouhinec (29), Pénestin et Locmiquélic (56), le 9 à Chavagne, Hirel et Iffendic (35)

Les maxima sont modestes : 200 le 9 avril au Rocleu/Peumerit-Quintin (22), 250 le 4, 150 le 19 et 250 le 29 avril au Curnic/Guissény (29).

La nidification est notée en 2003 sur les sites suivants :

Saint-Malo-de-Phily (35), Paimpol (22), Guilers, Plounéour-Trez (29), Hoëdic et Sarzeau (56).

12 à 15 couples nicheurs sont dénombrés à Hoëdic.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*.

Les plus gros rassemblements sont notés en septembre : environ 3 000 le 29 à la Cantache/Montreuil-sous-Pérouse (35).

L'espèce est régulièrement vue en octobre, jusqu'au 23 à Cancale (35), 26 à Hoëdic (56) et 28 à Pleubian (22). En novembre, toutes les observations proviennent du Finistère. Les dernières sont vues le 20 à Ouessant, le 24 à Lampaul-Plouarzel et le 26 à Brignogan-Plage.

L'hiver qui suit est marqué par l'absence de l'espèce.

Les premiers retours sont notés le 4 mars à Grand-Lieu (44), le 5 à Plonéour-Lanvern (29), le 6 à Pédernec (22), le 15 mars à Iffendic (35),...200 le 3 avril à Guidel (56), 100 le 9 à Clédén-Cap-Sizun (29).

HIRONDELLE ROUSSELIN *Hirundo daurica*.

2 individus sont vus en avril en Loire-Atlantique, le 26 aux Moutiers-en-Retz et le 27 à Saint-André-des-Eaux.

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*.

En fin d'été 2002, plusieurs colonies font l'objet de recensement dans les Côtes-d'Armor : 25 nids à Trébry, 11 à Plouézec et 31 à Paimpol.

Les observations sont régulières en septembre et un nourrissage a encore lieu le 28 à Sein (29). Sur le continent, la dernière est vue le 14 octobre à Châtillon-en-Vendelais (35), puis le 19 à Ouessant (29) et le 26 à Hoëdic (56).

Un précurseur est à Ouessant le 9 mars, les suivantes sont à la Chapelle-Erbrée (35) le 6 avril, Hillion (22) le 7, Ancenis (44) le 12, Pont-l'Abbé (29) le 18 et Hoëdic (56) le 21.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardii*.

Toutes les observations proviennent d'Ouessant (29) où une quinzaine de données sont recueillies du 9 octobre au 14 novembre, toutes n'ont pas été soumises au C.H.N., et seuls 3 ou 4 individus ont été homologués.

PIPIT DE GODLEWSKI *Anthus godlewskii*.

Un oiseau est observé du 22 au 26 octobre à Ouessant (29). Il s'agit de la 3^e donnée française et de la 2^e pour la Bretagne.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*.

4 individus en septembre, le 13 à Ouessant (29), le 18 à Grand-Lieu (44) et les 15 et 29 à Hirel (35) ; 2 en octobre, le 1^e à Plomeur (29) et du 12 au 26 à Ouessant (29).

Au printemps, 1 est le 3 mai à Sein (29).

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*.

69 individus sont dénombrés du 15 août au 28 septembre à Tréogat (29) et 19 observations sont faites du 18 août au 19 octobre à Ouessant (29).

Les premiers sont le 19 mars à Talensac (35), le 31 à Ouessant, le 6 avril à Languidic (56) et le 12 à Plounérin (22). A Hoëdic (56), le dernier migrateur est vu le 18 mai.

6 à 7 chanteurs sont dénombrés le 15 juin sur 1 300 mètres à Brandivy (56). En limite de répartition, l'espèce est contacté à Plounérin (22), Hanvec, Lanmeur, Le Faou et Trégarvan (29).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*.

Les premiers migrateurs sont notés à partir du 11 septembre au Rheu (35). Les données sont nombreuses en octobre où on note par exemple 160 le 14 à Hoëdic (56).

En période de reproduction, 38 sites sont recensés dans les Monts d'Arrée (29), à Berrien, Botsorhel, Brasparts, La Feuillée, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Plounéour-Ménez et Scrignac. Non loin, à Lohuec (22), 3 sites sont repérés.

Sur le littoral, la reproduction est constatée à Plévenon (22), Plouarzel, Goulien (29) et Hoëdic (56).

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*.

1 le 2 octobre à Ouessant (29) et 1 du 20 au 25 octobre à Hoëdic (56).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*.

A l'automne, on note quelques rassemblements : 12 le 12 octobre à la pointe des Saisies/Gâvres (56), 12 le 30 à la pointe du Chevret/Saint-Jacut-de-la-Mer (22), 20 le 1^{er} novembre à la pointe de Primel/Plougasnou (29), 20 le 17 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35).

1 individu présentant les caractéristiques de la forme *A. p. littoralis* est identifié le 11 avril à Hoëdic (56).

Au printemps 2003, 1 couple à l'île des Landes/Cancale et 1 au Grand Chevreuil/Saint-Coulomb (35), 13 à 15 couples sur 7 îlots de la baie de Morlaix, 1 famille à Enez Amann ar Rouz/Kerlouan, 1 couple à Trévorc'h/Saint-Pabu, 1 nid au Loc'h/Fouesnant (29), 1 couple à Rohellan/Erdeven et au moins 2 sites de nidification repérés à Hoëdic (56).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*.

Le premier est noté le 27 septembre à l'île Tomé/Louannec (22), l'espèce est ensuite contactée le 5 octobre à Hirel (35), le 18 à Plonéour-Lanvern (29), le 21 à Hoëdic (56)...

La plupart des observations concernent moins de 10 individus. Peu de groupes importants sont signalés : 17 le 22 octobre au Moulin Neuf/Plonéour-Lanvern, 13 le 1^{er} décembre à Hirel et 14 le 21 décembre à Pacé (35).

Les derniers sont détectés le 14 mars à Péder nec (22), le 20 à Plounérin (22), le 13 avril à Hoëdic (56) et le 14 mai à Grand-Lieu (44).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*.

En fin d'été, des juvéniles sont vus à Goulven (29), Le Tour-du-Parc, Locmiquélic et Sarzeau (56).

A Ouessant (29), le passage est noté du 21 août au 24 octobre.

La première est de retour le 22 mars à Erdeven (56).

A Hoëdic (56), la migration printanière s'étale du 12 avril au 16 mai pour la sous espèce type *M. f. flava*, la Flavéole *M. f. flavissima* étant signalée du 10 avril au 18 mai.

BERGERONNETTE PRINTANIERE TYPE *Motacilla flava flava*.

En mai, cette forme est contactée à Locmiquélic (56) et Saint-Joachim (44), ce qui est très loin de la réalité.

BERGERONNETTE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*.

Après la mi-mai, cette sous-espèce est signalée à Pleudihen-sur-Rance (22) et Tréguennec (29).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*.

Le passage postnuptial est noté du 12 septembre à début novembre à Ouessant (29) et du 29 septembre au 25 octobre à Hoëdic (56).

BERGERONNETTE GRISE SSP.. *Motacilla alba ssp.*

Quelques dortoirs hivernaux sont signalés sur la période : 800 le 10 octobre et 900 le 20 novembre à Vannes (56), 350 le 5 novembre à Dinan (22), 270 le 25 janvier à Pléneuf-Val-André (22), 1 160 le 5 mars à la gare de Brest (29) où 10 *M.a. alba* sont repérées parmi 853 *M.a. yarrellii* le 17 mars.

BERGERONNETTE GRISE TYPE *Motacilla alba alba*.

Le passage à Ouessant (29) se déroule du 26 août au 31 octobre (pic du 8 au 20 octobre).

Cette sous espèce est identifiée à l'unité le 24 novembre à Iffendic (35) et le 11 janvier à Sizun (29).

La remontée est signalée à Ouessant du 5 au 25 mars. Des migrateurs attardés sont vus en juin à Ouessant et Hoëdic (56).

BERGERONNETTE DE YARRELL *Motacilla alba yarrellii*.

Les premières sont le 4 septembre à Ouessant (29), puis le 10 à Guingamp (22), le 28 à Morlaix (29), le 29 à Hoëdic (56), le 9 octobre à Rennes (35),...

Le passage à Ouessant est noté du 6 octobre au 5 novembre.

Les départs ont lieu en mars : les 10 dernières sont le 23 à Guissény (29).

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus*.

Cette espèce est notée exceptionnellement en Bretagne. Quelques oiseaux ont été vus à partir de la fin de l'hiver : 2 (1 femelle et 1 1^e hiver) le 15 février puis 1 le 17 à Plérin (22) et 1 femelle adulte suivie de la fin mars au 12 avril à Saint-Nazaire (44).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*.

R.A.S..

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis*.

R.A.S..

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula*.

Un passage concernant des milliers d'individus est observé sur Ouessant (29) les 18, 19 et 26 mars.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*.

Le premier est noté le 7 avril sur un site très inhabituel, l'île Penfret aux Glénan/Fouesnant (29).

Deux données intéressantes sont recueillies ensuite fin mai : 1 chanteur le 24 au Mesnil des Aulnays/Plerguer (35) et 1 couple le 25 à Férel (56), non loin de la population ligérienne néanmoins.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*.

Encore un nourrissage le 27 juillet à Pen Mané/Locmiquélic (56).

58 individus sont capturés entre le 15 juillet et le 19 octobre à Trunvel/Tréogat (29) ; 1 le 22 septembre à Ouessant (29).

Les 2 premiers individus sont le 4 mars à Kersahu/Gâvres (56).

2 migrateurs sont découverts sur les îles au printemps : 1 les 29 et 30 mars à Ouessant, 1 le 7 avril à Hoëdic (56).

Au printemps 2003, en dehors de la Loire-Atlantique, l'espèce est contactée à Careil/Iffendic, Timouy/Sainte-Anne, Gannedel/La Chapelle-de-Brain, Droulin/Langon (35), Gâvres, Locmiquélic, Rieux et Sarzeau (56).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*.

1 femelle est observée le 31 juillet sur l'île de Bréhat (22), localité où l'espèce ne semble pas être connue comme nicheuse.

En octobre, le dernier chant est entendu le 7 à Saint-Brieuc (22).

Le passage se déroule du 5 octobre au 28 novembre à Ouessant (29) et du 12 octobre au 4 novembre à Hoëdic (56), île où la présence d'observateurs a été plus restreinte.

Le pic est atteint du 12 au 31 octobre, maximum 55 le 21 à Ouessant.

Si la majorité des observations hivernales provient de localités littorales, quelques mentions proviennent de sites franchement intérieurs en décembre et janvier tels La Mézière (35), Baud ou Ploërmel (56).

Des hivernants chantent en mars, le 8 à Saint-Pol-de-Léon (29) et le 18 à Plouarzel (29).

Un passage est ressenti à Ouessant du 13 mars au 16 avril, avec un pic de 6 le 15 mars, et à Hoëdic du 16 mars (pic de 25 ce jour-là) au 13 avril.

1 individu apparemment égaré est le 9 juin sur l'île Saint Nicolas aux Glénan/Fouesnant (29).

Les premiers chanteurs sur site de reproduction sont notés le 9 mars à Baud et le 14 à Dinan (22).

1 se trouve le 27 mai dans le port de commerce de Brest (29), localité où la reproduction a déjà été prouvée.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*.

Le passage se déroule du 16 août au 26 octobre à Hoëdic (56) et du 29 août au 19 octobre à Ouessant (29) avec un maximum en septembre. Sur le continent, les mouvements sont perçus du 24 août au 21 octobre.

Le premier est noté le 4 avril à Ouessant (29), suivi par 2 autres isolés les 10 et 23 avril sur le même site. D'autres migrateurs sont notés jusqu'au 8 mai.

En période de reproduction, plusieurs sites d'Ille-et-Vilaine fournissent des observations :

- la forêt de Villecartier/Bazouges-la-Pérouze.
- la forêt de Fougères.
- la forêt de Rennes.
- le château du Bois Orcan/Noyal-sur-Vilaine.
- la forêt de Paimpont.

Un couple produit des jeunes au printemps 2003 en milieu non forestier sur la commune de Tréméhec (35).

TARIER D'EUROPE *Saxicola rubetra*.

A l'automne, le passage est noté du 12 août au 19 novembre avec un pic très marqué du 3 au 10 septembre : 40 le 3 à Trévan/Peumerit (29), 70 le 4 à Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35), 30 le 5 à Saint-Lumine-de-Coutais (44), 50 le 10 à Hirel (35).

Une donnée très hâtive est recueillie le 9 mars à Plouhinec (56), mais il est vraisemblable qu'il puisse s'agir d'une confusion avec un Tarier pâtre *Saxicola torquata*. La donnée suivante est également en avance, le 3 avril sur l'île Tomé (22).

Les derniers migrateurs sont vus le 4 mai à Yffiniac (22).

Dans les Monts d'Arrée (29), 1 chanteur est le 3 mai dans le Yeun Elez et 1 famille est découverte le 6 juillet à Pen ar Pajou/Plounéour-Ménez (29).

Seul 1 couple est trouvé lors du printemps 2003 à Grand-Lieu (44).

TARIER PATRE *Saxicola torquata*.

R.A.S..

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*.

Le passage se déroule du 6 août au 15 novembre avec une intensité plus marquée entre le 27 août et le 28 septembre ; les maxima atteignent 36 le 27 août, 50 le 15 septembre, 66 le 28 à Sein (29), 30 le 30 août sur la Côte Sauvage de Quiberon (56), 46 le 31 à la Falaise/Erdeven (56).

1 individu attribué à la sous-espèce *O.o. leucorhoa* est présent du 13 au 15 octobre sur Hoëdic (56).

Les premiers sont à Guissény (29) et Erdeven (56) le 9 mars.

Le dernier migrateur est le 27 mai à la ZIP/Brest (29).

Des individus attribués à la sous-espèce *O.o. leucorhoa* sont détectés les 29 avril et 4 mai.

La nidification est rapportée du Finistère et du Morbihan :

- 10 couples sont recensés dans l'archipel de Molène (29) (1 à Banneg, 3 à Balaneg et 6 à Trielen).
- 1 couple et des jeunes en juillet à Saint-Pabu (29).
- 1 couple au Ménez Mikel/Saint-Rivoal (29) dont le mâle chante dès le 27 mars.
- 1 couple sur Sein (29).
- 1 juvénile le 26 juin à la pointe du Raz/Plogoff (29).
- 2 couples dans la presqu'île de Quiberon (56).

1 premier individu en déplacement est présent à Trunvel/Tréogat (29) le 13 juillet.

TRAQUET PIE *Oenanthe pleschanska*.

1 femelle de 1^e année stationne à Ouessant (29) du 14 octobre au 18 novembre.

TRAQUET OREILLARD *Oenanthe hispanica*.

1 individu de la sous-espèce *O.h. melanoleuca* est le 24 octobre à Hoëdic (56).

GRIVE A JOUES GRISES *Catharus minimus*.

1 juvénile séjourne du 12 au 14 octobre à Ouessant (29). Il s'agit de la 3^e donnée française et de la 2^e donnée ouessantine.

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*.

Le passage, soutenu, est noté sur les îles du 22 septembre au 29 octobre avec quelques très belles journées sur Ouessant (29) en octobre : 17 le 11, 23 le 14, 48 le 16, 8 le 19. Le pic est de 5 le 16 octobre sur Hoëdic (56). La première donnée, du 22 septembre, est la seule à provenir du continent : 1 dans la carrière de Quinipily/Baud (56). Il ne fait aucun doute que de nombreux oiseaux passent inaperçus.

La remontée concerne une vingtaine d'individus entre le 26 mars et le 27 avril, maximum 4 le 9 avril à Kerharo/Plomeur (29).

MERLE NOIR *Turdus merula*.

R.A.S.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*.

Une donnée très hâtive concerne 15 individus au lycée du Restmeur/Pabu (22) le 19 septembre.

Le passage démarre le 7 octobre à Ouessant (29), il y reste faible jusqu'à sa fin prématurée, le 24 octobre.

Sur le continent, les mouvements ne démarrent vraiment qu'au début novembre, 20 le 1^{er} à Kergall/Languidic (56), des groupes étant ensuite notés régulièrement jusqu'à la mi-mars.

En décembre et janvier, les bandes de plus de 150 individus se comptent sur les doigts d'une main : 165 le 23 décembre à Gorré Beuzec/Tréguennec (29), 180 le 24 janvier aux Basses Landes/Sérent (56).

Le dernier groupe important concerne 86 individus le 13 mars à Kerassio/Languidic alors que les dernières hivernantes quittent Ouessant le 19.

Les dernières départementales sont du 7 avril dans les Côtes-d'Armor, du 9 dans le Finistère et du 11 dans le Morbihan.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*.

Le passage se déroule du 1^{er} octobre au 5 novembre à Ouessant (29) avec une arrivée de plusieurs centaines d'individus dans la nuit du 10 au 11 octobre. Sur Hoëdic (56), plus de 1 000 oiseaux sont présents le 20 octobre.

24 migrants sont présents le 10 avril à Roc'h Hir/Ouessant (29).

Outre les imitations habituelles de Pic noir *Dryocopus martius*, on peut remarquer celles, plus confidentielles, du Pic mar *Dendrocopos medius*, les 15 et 23 mars à Coat Tromarc'h/Trémel (22) et le 30 mars en forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre (22).

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*.

21 sont notées très hâtivement le 5 septembre à Boutdeville/Langueux (22).

Sinon, le passage se déroule du 1^{er} octobre au 28 novembre à Ouessant (29).

Le maximum du passage est détecté vers la mi-octobre : le 16, des centaines à Sein (29) et des milliers à Ouessant ; le 20, 1 000+ à Hoëdic (56).

Sur le continent, les mouvements sont sensibles jusqu'à la fin novembre.

En décembre et janvier, le maximum est de 500 à 600 le 18 décembre à Tourous/Saint-Renan (29).

La remontée semble débuter peu après la mi-février et s'achève le 10 avril à Hoëdic ; on note 300/30' le 26 mars à Campénéac (56).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 6 au 25 octobre ; à Hoëdic (56), quelques individus sont détectés entre le 14 octobre et le 4 novembre.

38 sont vues en vol le 8 novembre entre Mauron et Concoret (56).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*.

A Trunvel/Tréogat (29), où 206 captures sont opérées, le schéma est le même que les années précédentes : les oiseaux nichant sur le bassin versant arrivent en nombre dans la roselière vers le 10 septembre.

3 individus isolés sont notés à Ouessant (29) entre le 3 septembre et le 11 octobre.

1 migrateur est entendu à l'étang du Moulin Neuf/Plounéris (22) du 25 au 30 octobre.

Les mentions intérieures sont peu nombreuses dans l'Ouest mais quelques localités s'ajoutent à celle citées l'an passé et qui sont de nouveau occupées pour l'essentiel :

Kergogan/Ploudalmézeau (29), Kergollaire/Languidic (56) et l'étang de la Forêt/Brandivy (56).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis*.

A Ouessant (29), 2 individus sont détectés en juillet avant que quelques individus (4 ou 5 ?) ne passent entre le 23 septembre et le 16 octobre.

1 famille est découverte le 12 octobre à l'étang de Careil/Iffendic (35).

Quelques localités non signalées jusqu'à présent, mais pas forcément nouvelles, viennent s'ajouter à celles publiées depuis 1991 : Bréhat (22), Daoulas, Guilers, Hôpital-Camfrout, Kernouës, Plouyé, Saint-Yvi (29), Saint-Gilles (35), Saint-Joachim (44), Brandivy, Damgan, Lanester, Le Hézo, Saint-Armel (56). L'espèce est également contactée dans le camp de Coëtquidan/Campénéac et Guer (56).

La tendance est toujours nettement à la hausse.

Les premiers chanteurs sont notés le 23 février à Kersahu/Gâvres (56).

1 le 16 mai à Ouessant (29), site où l'espèce réapparaît ensuite le 8 juillet. A Hoëdic (56), la Cisticole paraît présente tout au long de la période.

LOCUSTELLE DE PALLAS *Locustella certhiola*.

1 juvénile stationne sur Hoëdic (56) du 19 au 21 octobre, il s'agit de la 4^e mention française.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*.

La dernière mention sur un site de reproduction date du 28 juillet dans les Monts d'Arrée (29).

1 le 17 août à Trunvel/Tréogat (29) et 1 le 8 septembre à Hoëdic (56). A Ouessant (29), le passage se déroule du 29 août au 4 octobre.

La première est le 30 mars en forêt du Gâvre (44).

Le passage est noté en avril et jusqu'au 6 mai.

Après le 15 mai, la Locustelle tachetée est contactée dans le marais de Dol, en forêt de Chevré/Acigné (35), à Mellionnec, à Kerlavezan/Lohuec (22), dans les Monts d'Arrée, à Lanveur/Plounéour-Trez, au Navan/Landunvez, à Kastel Ruphel/Saint-Goazec et à Loc'h ar Stang/Tréguennec (29).

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*.

Le dernier chanteur est entendu le 3 août en baie d'Audierne (29).

140 captures sont réalisées à Trunvel/Tréogat (29), la dernière en date du 27 septembre.

Les retours sont notés le 31 mars à Grand-Lieu (44) et le 5 avril en baie d'Audierne (29).

L'espèce est contactée sur les sites suivants au cours du printemps : le marais de Gannedel (35), la baie d'Audierne (29), Pen Mané/Locmiquélic, Kervran/Plouhinec, la Falaise et Kéravéon/Erdeven, le Cranic et la basse vallée du Loc'h/Brec'h (56), le marais Audubon et le lac de Grand-Lieu (44).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*.

198 captures (109 l'an passé), sont opérées dans les deux grands camps de baguage de l'automne, 146 au Massereau/Frossay (44) et 42 à Trunvel/Tréogat (29), du 4 août au 28 septembre sur ce dernier site. A Trunvel, la médiane est atteinte le 23 août. On peut noter qu'un individu bagué le 13 août à Trunvel est repris 10 jours plus tard au Massereau.

Sur d'autres sites, on note : 1 le 4 août à Guérande (44), 4 capturés le 3 septembre à Pen Mané/Locmiquélic (56), 1 les 15 et 16 septembre à Hirel (35).

Le dernier est le 1^e octobre au Massereau.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*.

Les opérations de baguage donnent les résultats suivants : 3 275 captures (+53% par rapport à l'année précédente) en baie d'Audierne (29) jusqu'au 16 octobre. A Trunvel/Tréogat (29), le pic de passage est constaté vers la mi-août.

Le passage se déroule du fin juillet au 24 octobre à Ouessant (29), 1 le 8 octobre à Trielen/archipel de Molène (29)

Les premiers sont de retour en mars, le 4 à Kersahu/Gâvres (56) et le 14 en baie d'Audierne...

Le dernier migrateur certain chante le 17 mai à Hoëdic (56), mais l'individu contacté le 20 mai au Paluden/Minihy-Tréguier doit en être un autre.

En 2003, il y a 10+ couples reproducteurs à Ouessant (29).

ROUSSEROLLE ISABELLE *Acrocephalus agricola*.

1 1^e automne est vu à Ouessant (29) le 30 octobre sur Ouessant (29).

ROUSSEROLLE DES BUISSONS *Acrocephalus dumetorum*.

1 1^e automne est vu à Ouessant (29) les 29 et 30 octobre sur Ouessant (29). Il s'agit de la 7^e mention pour la France.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*.

2 contacts auraient été obtenus le 17 juillet sur la côte léonarde (29) : 1 au Vougot/Guissény et 1 alarmant à Prat Lédan/Plouguerneau. Faute de précision, le conditionnel s'impose.

2 ou 3 individus sont identifiés à Ouessant (29) à l'automne : 1 le 16 octobre et 1 ou 2 entre le 30 octobre et le 4 novembre. A Hoëdic (56), 1 individu stationne du 21 au 26 octobre.

1 le 1^e mai à Ouessant.

3 chanteurs sont notés entre le 22 mai et le 9 juin à Chantoiseau/Saint-Hélen (22) ; les premières sont contactées le 24 mai dans le marais de Dol (35).

1 chanteur est noté à Radenog/Brignogan-Plage (29) le 1^e juin.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*.

1 939 individus sont capturés en baie d'Audierne (29) de juillet à fin septembre. Sur ce site, où le dernier poussin, à peine volant, est noté le 4 septembre, 1 individu, bagué le 12 août à Donges (44) est pris le 25 août.

A Ouessant (29), où 29 sont capturées au Niou du 20 au 22 août, le passage se termine le 5 novembre. A Hoëdic (56) et à Grand-Lieu (44), les dernières sont vues le 26 octobre.

La première, très hâtive, est de retour le 19 mars à Sarzeau (56), mais les suivantes arrivent de façon groupée le 8 avril puis à partir du 14.

Sur Sein (29), 1 est dans une haie le 3 mai.

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*.

Il n'y a aucune mention, ce qui ne veut pas dire que cette espèce était absente !

HYPOLAIS BOTTEE *Hippolais caligata*.

2 individus passent sur les îles à l'automne : 1 le 22 octobre à Hoëdic (56) et 1 le 7 novembre à Ouessant (29).

Il s'agit des 6^e et 7^e données françaises et des 4^e et 5^e données bretonnes de cette espèce.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*.

1 jeune est le 17 août à Léhan/Tréffiagat (29), il s'agit peut-être d'un oiseau local en fin de séjour ; 6 individus passent à Ouessant (29) entre le 18 août et le 19 octobre ; 1 le 19 septembre à l'étang du Relecq-Kerhuon (29) ; dernière le 22 octobre à Hoëdic (56).

La première est de retour le 15 avril à l'étang de Careil/Iffendic (35).

En limite de répartition, l'espèce est contactée en 2003 à Combrit (29).

1 chanteur le 14 juillet à Ouessant.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*.

Le 19 octobre, l'espèce est notée sur deux sites atypiques : une friche dépourvue d'ajoncs en bordure orientale de l'aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande (35) et la pointe du Cosmeur/Carantec (29), où elle n'est pas connue pour se reproduire. Il s'agit peut-être d'indices de passage.

L'espèce est notée en Loire-Atlantique le 7 mars près de la plage de l'Etang/Pornic.

Le 27 mai, 1 sur le polder de la ZIP/Brest (29).

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantilans*.

1 femelle les 23 et 24 avril à Ouessant (29).

FAUVETTE ORPHEE *Sylvia hortensis*.

1 mâle chanteur le 25 juin à Ouessant (29).

FAUVETTE EPERVIÈRE *Sylvia nisoria*.

3 individus de 1^e automne sont identifiés à Ouessant (29) : 1 du 14 au 23 octobre, 1 du 18 au 22 octobre, 1 les 12 et 14 novembre.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*.

5 individus passent à Ouessant (29) entre le 9 et le 2 octobre ; 2 stationnent du 14 au 17 octobre à Sein (29).

Au début mai, on note : 1 chanteur le 6 à Toull Bili/Trédrez-Locquémeau (22) et 1 couple le 9 sur Bréhat (22).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*.

Le passage se déroule du 14 août au 25 octobre à Ouessant (29), on note également la dernière le 24 octobre à Hoëdic (56).

La première est de retour le 29 mars à Tresboeuf (35).

Les autres premières départementales interviennent le 30 dans le Morbihan, le 13 avril dans le Finistère et le 17 dans les Côtes-d'Armor.

On note 15 individus le 19 avril sur Hoëdic et 25+ le 27 à Careil/Iffendic (35).

L'espèce arrive le 14 avril à Ouessant où 1 seul couple s'installe.

L'espèce semble moins abondante au printemps 2003 qu'en 2002 selon les données transmises.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*.

Le passage s'achève le 18 octobre à Hoëdic (56) et le 20 sur l'île d'Ouessant (29).

La première est à Saint-Just (35) le 10 avril.

Parmi les autres premières départementales, on relève celle du 14 avril dans le Finistère et du 15 dans le Morbihan.

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*.

Sur les îles d'Ouessant (29) et d'Hoëdic (56) le passage s'arrête fin octobre début novembre ; l'individu contacté le 16 novembre sur Ouessant pourrait être une future hivernante.

20 sont le 16 mars à Hoëdic alors que la première migratrice est le 18 à Ouessant.

POUILLOT DE PALLAS *Phylloscopus proregulus*.

3 individus en octobre pour 3 îles : 1 le 18 à Sein (29), 1 le 19 à Hoëdic (56) et 1 les 29 et 30 à Ouessant (29).

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*.

23 individus passent à Ouessant (29) entre le 3 septembre et le 16 novembre avec un creux du 28 septembre au 8 octobre et un maximum de 9 le 16 octobre ; 1 le 19 septembre à Hillion (22) ; 1 le 3 octobre à Groix (56) ; 1 le 18 octobre à Sein (29) ; 1 trouvé mort le 19 novembre au centre-ville de Ploemeur (56).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*.

Aucune donnée pour la période.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*.

2 ou 3 individus séjournent à Ouessant (29) entre le 7 et le 21 octobre.

Le premier est en forêt du Cranou (29) le 22 avril.

L'espèce est contactée au printemps 2003 sur les sites suivants : bois de Gâtines, étang du Boulet, forêt de Saint-Aubin-du-Cormier, forêt de Rennes, forêt de Chevré, forêt du Pertre, forêt de Paimpont (35), forêt de Loudéac (22), bois du Relecq, forêt du Cranou, forêt de Coatloc'h (29) et rien pour le Morbihan et la Loire-Atlantique.

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*.

Des Pouillots de Sibérie *P.c. tristis/fulvescens* sont capturés à Montoir-de-Bretagne (44) : 2 le 18 décembre et 3 le 15 janvier. A Ouessant (29), des contacts concernent cette sous-espèce entre le 14 octobre et le 12 novembre.

4 Pouillots véloces « de type sibérien » présentant donc des caractéristiques intermédiaires entre le Pouillot de Sibérie et le Pouillot véloce nordique sont observés entre le 24 octobre et le 28 décembre à Ouessant ; 2 sont capturés le 18 décembre à Montoir-de-Bretagne.

Quelques Pouillots véloces nordique *P.c. abietinus* sont mentionnés entre le 19 octobre et le 4 novembre à Ouessant.

A Ouessant, le passage printanier est maximal entre le 18 et le 26 mars.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*.

Le passage démarre le 20 juillet à Iffendic (35) et se termine le 19 octobre à Ouessant (29) où un attardé est ensuite vu les 16 novembre et... 27 décembre ! Les mouvements culminent de la mi-août à la mi-septembre.

Le premier est le 12 mars à Lann Bourgeol/Inguiniel (56), puis l'espèce est noté le 25 en Ille-et-Vilaine, le 27 dans le Finistère, le 29 en Loire-Atlantique et le 30 mars dans les Côtes-d'Armor.

Les derniers migrateurs sont détectés le 18 mai, après cette date l'espèce n'est plus contactée qu'en forêt de Chevré/Acigné (35), dans le secteur du Trégor intérieur sur les communes de Belle-Isle-en-Terre, Plounérin et Plounévez-Moëdec (22), dans les Monts d'Arrée (29), à Boiséon/Lanmeur (29) et en forêt du Cranou (29).

Un chanteur au chant mixte Fitis/Véloce *P. trochilus***P. collybita* est entendu en forêt du Cranou du 3 au 26 mai.

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*.

15 familles sont détectées entre la fin juillet et le 25 août, l'espèce se reproduisant tardivement.

A Ouessant (29), le passage est noté du 3 septembre jusqu'à la 1^e semaine de novembre. Sur Hoëdic (56), le passage est maximal les 20 et 22 octobre avec 15 individus.

La 1^e famille est découverte le 19 juin à Trélivan (22).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*.

Le passage démarre le 1^e septembre pour s'achever début novembre sur Ouessant (29). Sur cette île comme sur Hoëdic (56), le pic est atteint en octobre.

Les premiers chants sont entendus le 26 février à Sougéal (35).

14 localités donnent lieu à des contacts en période de reproduction (après le 30 avril) : la forêt de Villecartier/Bazouges-la Pérouse, la forêt de Fougères, la forêt de Chevré/La Bouëxière (35), la forêt de Loudéac, le manoir et la forêt de Beffou/Loguivy-Plougras, Coat Tromarc'h/Trémel (22), Kerfaven/Ploudiry, le bourg de Daoulas, la forêt du Cranou/Hanvec, Kernec'h/Combrit, Rosulien/Plomelin, Penvelet/Plomelin et Stang Jet/Saint-Yvi (29). Dans le Morbihan, 4 communes fournissent des données printanières sans précision et il n'est pas possible de les considérer à coup sûr comme relatives à des reproducteurs : Brandérion, Inguiniel, Larmor-Baden et Locoal-Mendon.

GOBEMOUCHE GRIS *Musicapa striata*.

Le passage se déroule du 19 août au 4 novembre à Ouessant (29) avec un maximum lors des deux premières décades de septembre ; à Hoëdic (56), les données s'étalent du 16 août au 29 septembre ; à Sein (29), le dernier contact est obtenu le 28 septembre.

Les retours sont particulièrement hâtifs : le 3 avril en forêt de Loudéac (22) et le 5 à Grand-Lieu (44). Les autres premières départementales sont obtenues le 30 avril en Ille-et-Vilaine, le 1^e mai dans le Finistère, le 16 mai dans le Morbihan.

Sur les îles, le passage cesse le 17 mai.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva*.

5 individus semblent être passés par Ouessant (29) entre le 15 septembre et le 29 octobre contre 20 l'an passé.

Sur Sein (29), 2 individus sont notés le 28 septembre, 1 présente les caractéristiques du Gobemouche de la Taïga *F.(p.) albicilla*, 1 autre est découvert le 11 octobre.

Sur le continent, 1 adulte se trouve les 28 et 29 octobre à Pen Mané/Locmiquélic (56).

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*.

Le passage se déroule du 2 août au 29 octobre. Le pic de passage se déroule du 15 août au 15 septembre, maximum 7 le 17 août à Hoëdic (56).

Au printemps, 4 isolés passent à Ouessant (29) entre le 8 et le 16 avril ; 3 passent à Hoëdic entre le 13 et le 24 avril.

1 mâle chante le 2 juin en forêt du Cranou/Hanvec (29) ; 2 le 7 juin à Belz (56).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*.

377 captures (dont 282 juvéniles) sont effectuées à la station de baguage de Trunvel/Tréogat (29) entre juillet et octobre.

La reproduction est prouvée à l'étang du Curnic/Guissény (29) avec 1 famille les 18 et 19 août.

En été, l'espèce est observée à Kerloc'h/Camaret-sur-Mer & Crozon, en baie d'Audierne (29), à Pen Mané/Locmiquélic (56) (reproduction prouvée) et à Landrezac/Sarzeau (56).

En automne et en hiver, l'espèce est contactée en dehors de son aire de répartition à Ouessant (29) entre le 19 octobre et le 1^e novembre et à Lez ar Mor/Goulven (29) entre le 31 octobre et le 25 janvier.

La Panure est présente au printemps en baie d'Audierne, à Pen Mané/Locmiquélic et à Pradel/Guérande (44).

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*.

Le plus grand regroupement compte 45 individus le 25 novembre dans le marais de Gannedel/La Chapelle-de-Brain (35). Les bandes de plus de 20 individus sont observées entre le 8 septembre et le 11 février.

A Ouessant (29), 2 couples se reproduisent au printemps 2003 pour la 2^e année consécutive.

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*.

Les données sont assez nombreuses pour cette espèce peu commune qu'il conviendrait de noter systématiquement afin d'en suivre l'évolution. Les données intérieures dominent largement.

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*.

Cette espèce à la distribution nordique pourrait faire l'objet d'une plus grande attention. Dans l'état actuel des choses, il est difficile d'en dire quoi que ce soit, tant elle est peu notée.

MESANGE NOIRE *Parus ater*.

Une seule donnée concerne un individu en dehors des secteurs de nidification : 1 le 6 décembre à Rennes (35).

L'espèce est présente sur sites de reproduction dans les localités suivantes : forêt de Paimpont (35), forêt de Loudéac, forêt de Duault/Saint-Servais, forêt de Coat an Noz/Belle-Isle-en-Terre, forêt de Beffou/Loguivy-Plougras (22), forêt de Fréau/Poullaouen, forêt d'Huelgoat, Monts d'Arrée, forêt de Landévennec (29), forêt de Camors et forêt de Floranges/Camors (56).

La reproduction est prouvée en forêt de Beffou/Loguivy-Plougras et au Roc'h Cléguer/Brasparts, dans les Monts d'Arrée.

MESANGE BLEUE *Parus caerulus*.

L'espèce est observée à Hoëdic (56) les 13 et 16 octobre et à 4 reprises à Sein (29) entre le 29 septembre et le 3 mai.

MESANGE CHARBONNIERE *Parus major*.

Deux indices de passage sont recueillis sur les îles en octobre : 1 le 21 à Hoëdic (56) et 2 arrivent de la mer le 23 à Kadoran/Ouessant (29).

SITTELLE TORCHEPOT *Sitta europea*.

Des loges de Pic noir *Dryocopus martius* ont été maçonnées à Beauport/Paimpol (22) et à Coat Tromarc'h/Trémel (22) au printemps 2003.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*.

3 massifs d'Ille-et-Vilaine fournissent des mentions : la forêt de Rennes (avec notamment 4 chanteur le 15 mars et 3 le 22), la forêt de Paimpont (1 chanteur le 15 mars) et la forêt de Villegardier (1 chanteur le 30 mars).

Le milieu où le chanteur a été repéré en forêt de Paimpont diffère notablement du taillis sous futaie de hêtre de chêne utilisé exclusivement par l'espèce en Ille-et-Vilaine jusqu'à présent : il s'agit plutôt d'un boisement mixte de feuillus et de résineux moins ombreux. Une confirmation s'impose.

1 individu aurait été contacté, sans plus de précision, le 1^e mai au château de Gilles de Bretagne/Saint-Cast-le-Guildo (22). Nous publions cette information avec toutes les réserves qui s'imposent.

GRIMPEREAU DES JARDINS *Certhia brachydactyla*.

R.A.S..

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus*.

6 le 14 octobre à Trunvel/Tréogat (29), 1 les 23 et 26 à Hoëdic (56) et 1 le 4 novembre à Pen Mané/Locmiquélic (56).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*.

1 famille est le 25 juillet au Tronchet (35).

Il n'y a aucune mention après le 28 juillet en dehors de celle, particulièrement tardive, concernant 1 jeune ou une femelle le 12 octobre à Kerglonou/Plouarzel (29).

Le premier est de retour le 23 avril à Hoëdic (56). Sur cette île, le passage est remarqué jusqu'au 18 mai alors que des mentions proviennent de Molène (29) et de Sein (29) entre le 28 avril et le 7 mai.

En période de reproduction, le Lorient n'est noté que d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique en dehors de l'individu vu au Légué/Saint-Brieuc (22) les 24 et 27 juin.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*.

La dernière observation sur site de reproduction est faite le 24 juillet dans le marais de Dol (35).

Le passage est circonscrit entre le 25 août et le 12 octobre mais presque toutes les observations sont de septembre.

La première est notée le 9 mai à Ercé-en-Lamée (35).

4 couples sont dénombrés au printemps 2003 dans le marais de Dol (35) et 15 dans les marais de Vilaine (35-44-56). En Ille-et-Vilaine, l'espèce est présente au printemps sur d'autres communes : Saint-Thurial (1 couple), La Bosse-de-Bretagne (1 couple), Guipry (1 couple), La Dominelais (2 couples), Grand-Fougeray (2 couples).

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*.

Apparemment, une année blanche pour cette espèce, fait rare.

GEAI DES CHENES *Garrulus glanduarius*.

4 le 16 novembre sur Ouessant (29), donnée rarissime.

1 imite le Pic mar *Dendrocopos medius* (22) le 6 avril en forêt du Cranou (29).

PIE BAVARDE *Pica pica*.

Un dortoir regroupe 130 individus le 29 décembre à Careil/Iffendic (35).

CRAVE A BEC ROUGE *Pyrrhocorax pyrrhocorax*.

Une seule donnée en dehors des sites de reproduction : 4 le 29 septembre au-dessus de la pointe de la Garchine/Porspoder (29).

Toutes les autres données concernent les secteurs de reproduction connus avec quelques maxima : 19 en automne dans le secteur du Cap Sizun (29), 11 les 19 et 20 septembre ainsi que le 23 février à Locmaria-Plouzané (29), 27 le 12 octobre à Ouessant (29), 14 le 4 mai à la pointe de Pen Hir/Camaret-sur-Mer (29) et 12 le 11 juillet à Illien/Ploumoguer (29).

Quelques recensements très incomplets ont été réalisés au printemps 2003 :

Sites	Dépt	Nombre de couples
Ouessant	29	13
Léon	29	1+
Presqu'île de Crozon	29	1+
Cap Sizun	29	4+
Belle-Île	56	?
Total		19+

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*.

Le rassemblement le plus important regroupe 700+ individus le 8 novembre à Tourous/Saint-Renan (29).

L'espèce est contactée au printemps 2003 sur un certain nombre de cartes 10*10 restées vierges lors de l'enquête nicheurs 1980-1985 et de son complément pour les Côtes-d'Armor qui s'est achevé en 1989. On peut noter, sans être exhaustifs et en complément des informations publiées depuis l'année 2000 :

Forêt du Cranou (G08), Saint-Rivoal (G09), Duault (G14), Pont-de-Buis-les-Quimerch (H08), Pleyben (H09), Châtillon-en-Vendelais (H30), Thorigné-sur-Vilaine (I27), Forêt de Branguily (J18), Mauron (J22), Comper (J23), Scaër (K11), Bubry (K15), Campénéac (K22), Baud (L16), Lizio (L20), Ploërmel (L21), Trédion (M20), Etel (O15), Auray (O17), Sarzeau (P18) et Montoir-de-Bretagne (R23).

Il s'agit ici du nom et du numéro des cartes concernées.

L'amélioration constatée ne tient pas uniquement à un intérêt plus soutenu, une tendance à la hausse est perceptible.

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*.

1 le 28 février à Ouessant (29).

Les recensements menés en Ille-et-Vilaine au printemps 2003 ne sont pas exhaustifs : 156-160 nids sont dénombrés sur 5 colonies réparties sur 2 communes : Cesson-Sévigné et Pacé.

Dans les Côtes-d'Armor, 30 couples nichent au lycée agricole de Pommerit-Jaudy. Dans l'Est du département, 8 sont le 30 avril à Trémeur, d'où viennent-ils ?

Dans le Finistère, quelques colonies sont localisées à Bourg-Blanc, Kernouës, Lannilis, Lanrivoaré, Plomeur, Ploudaniel et Saint-Pol-de-Léon pour un minimum de 114 nids.

Dans le Morbihan, 2 sont le 5 avril à Ménéantoux/Bubry et 20 le 7 juin à Kerouriec/Erdeven.

En Loire-Atlantique, une seule mention concerne 50-75 nids le 9 mars dans une peupleraie de l'île Coton/Ancenis.

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone*.

245 en dortoir le 27 décembre à Luitré (35).

1 couple se reproduit sur Balaneg/archipel de Molène (29) en 2003.

GRAND CORBEAU *Corvus corax*.

Quelques données intéressantes sont recueillies avant la saison de reproduction ou à son début : 1 le 14 août à Trunvel/Tréogat (29), 1 parade le 16 août au-dessus de la forêt du Cranou (29), 2 à 5 du 14 au 20 octobre à Hoëdic (56), 2 le 22 décembre à Cudel/Spézet (29), 2 le 11 janvier au lac du Drenec/Sizun (29), 2 en parade le 24 février au Cragou/Le Cloître-Saint-Thégonnec (29), 2 parquent le 10 mars au Roc'h Trévèzel/Plounéour-Ménez (29), 1 le 11 à Meslan (56), 1 le 28 mars au Relecq/Plounéour-Ménez.

1 individu est noté à la pointe de Tréfeuntec/Plonévez-Porzay (29) entre le 24 janvier et le 4 avril.

32 couples se cantonnent en 2003, 29 construisent un nid (28 l'an passé), la tendance à la reprise se confirme, même si le mouvement est lent.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*.

Le dortoir des Monts d'Arrée (29) abrite plusieurs centaines de milliers d'individus au cours de l'hiver 2002-2003. Celui de Vannes (56) culmine à 9 200 individus le 22 février.

Les migrateurs arrivent à partir de la mi-octobre et il n'est plus noté de grandes bandes après le 10 mars.

ETOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*.

6 individus sont contactés dont 5 en été et à l'automne 2002 et 1 au printemps 2003.

1 adulte du 29 juillet au 1^e septembre à Molène et à Ouessant (29).

1 juvénile du 10 au 13 septembre à Sein (29).

1 juvénile du 28 au 30 septembre à Hoëdic (56).

1 juvénile le 6 octobre à Ouessant.

1 juvénile le 15 octobre à Trunvel/Tréogat (29).

1 adulte du 10 au 12 juin à Molène.

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*.

R.A.S..

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*.

En 2002, l'espèce est notée en dans les communes suivantes : Erbrée, Laignelet, Pacé et Vitré (35).

L'espèce est notée dans les communes suivantes en 2003 : Châtillon-en-Vendelais, Etreilles, Irodouër, Vendel (35) et Lanouée (56). Sur ce dernier site, des nourrissages sont notés le 5 juin.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*.

Le passage de bandes de plusieurs milliers d'individus sont notées entre le 19 octobre et le 11 novembre, maximum 18 000 le 29 octobre à Hoëdic (56).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*.

Le passage se déroule du 25 septembre au 5 novembre à Ouessant (29).

L'hivernage est peu marqué avec des maxima assez modestes : 30 les 6 et 9 décembre en forêt de Coëtquen (22) et 50+ le 5 février en forêt de Coat an Noz (22).

Le dernier est le 5 avril à Saint-Nazaire (44).

SERIN CINI *Serinus serinus*.

Le petit passage (10 observations) se déroule du 14 au 28 octobre à Ouessant (29).

La plus grosse bande concentre 40 individus le 12 janvier à Plouër-sur-Rance (22).

Au printemps 2003, en Basse-Bretagne intérieure, seules les communes de Guingamp, Plounévez-Moëdec (22), Pleyber-Christ (29) et Landévant (56) fournissent des mentions et encore à Plounévez-Moëdec le chanteur du 26 juin n'est-il que de passage.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*.

Une bande de 650 est notée le 8 décembre en forêt de Fougères (35).

CHARDONNERET ELEGANT *Carduelis carduelis*.

La plus grosse bande réunit 120 individus le 15 janvier à Paimpol (22).

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*.

A Ouessant (29), le passage est maximal durant les deux dernières décades d'octobre et début novembre : on note en particulier 10 000+ le 14 octobre. Passé la mi-novembre, les effectifs diminuent progressivement même si 100 sont encore notés le 15 décembre près du canal de l'Îlle à Saint-Grégoire (35).

En hiver, aucun groupe n'atteint la cinquantaine d'individus, le maximum étant de 44 les 28 décembre et 8 janvier à Trélivan (22).

Les derniers groupes sont notés début mars, le dernier étant le 29 mars à la station d'épuration de Meslan (56).

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*.

A Ouessant (29), l'espèce est absente du 21 octobre au 20 février. Sur l'île plus de 1 000 individus sont dénombrés au Kun le 7 septembre.

L'espèce est abondante sur Hoëdic (56) fin mars et début avril alors que des installations sont notées les 6 et 7 avril dans le Sud-Finistère.

Le passage se poursuit jusqu'à la fin avril avec notamment 250 le 10 à Penfret aux Glénan/Fouesnant (29) et 150 le 11 à Hoëdic.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*.

A Ouessant (29), 10 observations sont faites entre le 25 septembre et le 29 octobre avec une intensité plus marquée lors de la deuxième quinzaine d'octobre.

1 femelle de la sous-espèce *C. f. cabaret* le 16 octobre à Sein (29), 1 le 26 aux Forges (56), 1 le 12 novembre au Rheu (35), 1 *C. f. flammea* le 9 mai à Sein.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*.

L'invasion qui a débuté à la fin de la période précédente se poursuit tout au long de l'année avec des effectifs assez importants. Tous les mois sont concernés sauf juin.

A Ouessant (29), 18 observations sont collectées entre le 2 septembre et le 28 octobre avec un maximum remarquable de 120-130 le 14 octobre.

Les dernières grandes bandes sont observées en décembre et les derniers migrateurs probables sont notés en mars jusqu'au 23 peut-être.

A partir du début avril et jusqu'en juillet, l'espèce est observée sur de plusieurs sites et la reproduction est certaine, des chants étant entendus en mars dans les forêts de Chevré et de Fougères (35) et des jeunes observés le 4 mai en forêt de Paimpont (35).

On peut retenir la liste des sites occupés au printemps 2003 après le 1^{er} avril : bois de Chinsève, forêt de Rennes, forêt de Saint-Aubin-du-Cormier, forêt de Chevré, forêt de Paimpont (35), forêt de Lorge (22), Penlan/Plourin-les-Morlaix (29), forêt de Camors, la Lande du Temple/La Vraie-Croix (56).

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus*.

1 mâle gris chante le 29 mai à Sein (29) quasiment 1 an après le passage d'un autre individu sur l'île. Il s'agit de la 3^e donnée printanière pour la Bretagne.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*.

R.A.S..

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes*.

L'individu contacté le 12 août à Vern-sur-Seiche (35) est un nicheur local à n'en pas douter.

1 passe le 20 octobre à Hoëdic (56).

En automne et en hiver, jusqu'au 31 mars, le Grosbec est observé dans les communes d'Acigné, La Bouëxière, Liffré, Piré-sur-Seiche (35), Belle-Isle-en-Terre (22), Trébabu (29), Campénéac (56) ainsi qu'en forêt de Fougères (35), mais les effectifs sont très faibles.

Au printemps, les seules données proviennent de la forêt du Cranou/Hanvec (29), site inédit, et de la forêt de Chevré/Acigné. Aucune preuve formelle de reproduction n'est cependant rapportée.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*.

A Ouessant (29), le passage se déroule du 10 septembre au 5 novembre avec un pic bien marqué du 11 au 31 octobre : 23 les 16 et 20.

Sur le littoral léonard (29), l'espèce apparaît également en septembre : 1 du 14 au 16 au Curnic/Guissény, 3 du 21 au 23 puis 1 le 28 au Kernic/Plounévez-Lochrist. On note aussi 1 le 22 septembre à la pointe de Dinan/Crozon (29) et 1 le 28 à Trunvel/Tréogat (29).

En octobre, les observations se partagent quasi-exclusivement entre Ouessant et Hoëdic (56) où 1 individu est observé du 14 au 25. On note toutefois 1 du 30 octobre au 3 novembre à Kerpallud/Paimpol (22).

A partir du 28 novembre, l'espèce est contactée sur deux sites d'hivernage déjà fréquentés l'an passé : maximum de 10+ le 8 février dans la réserve de chasse/Hirel (35) et 3 le 19 décembre à Planguenoual (22).

1 le 14 mars à Ouessant.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*.

Le passage se déroule du 7 au 29 octobre à Ouessant (29) mais 6 individus sont découverts dès le 22 septembre au Kernic/Plounévez-Lochrist (29), ils y sont encore le 19 novembre.

Sur les autres sites, les mouvements démarrent à partir du 28 octobre : le 28, 1 au Curnic/Guissény (29) ; le 1^{er} novembre, 1 à Hoëdic (56) ; le 17 novembre, 1 à l'île Besnard/Saint-Coulomb (35).

Après le 17 novembre et jusqu'au 15 février, les données concernent des oiseaux sur les sites d'hivernage, on note les maxima : 4 à l'île Grande/Pleumeur-Bodou (22), 1 à la Groue/Saint-Pol-de-Léon, 1 au Kernic, 1 à la pointe de Combrit (29). L'ensemble est bien maigrelet.

Le dernier est le 12 avril au cap Fréhel (22).

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*.

1 est de passage le 28 août à Ouessant (29).

BRUANT ZIZI *Emberiza cirrus*.

4 individus sont découverts le 30 décembre à Hoëdic (56), île où l'espèce ne niche pas.

1 seul chanteur est entendu sur 119 points d'écoute autour de Grand-Lieu (44) au printemps 2003.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*.

1 le 3 septembre à Locmiquélic (56), 1 les 6 et 7 à Ouessant (29), 1 le 11 septembre à la Capitaine au lac de Grand-Lieu (44), 1 le 16 octobre à Ouessant.

1 le 1^e avril à Ouessant, 1 les 23 et 26 avril à Hoëdic (56).

BRUANT NAIN *Emberiza pusilla*.

1 juvénile est capturé le 2 octobre à Trunvel/Tréogat (29).

1 le 8 mars à Kerminihy/Erdeven (56) et 1 le 23 avril à Hoëdic (56).

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*.

383 dont 232 juvéniles sont capturés à Trunvel/Tréogat (29) en fin d'été et à l'automne.

Le passage est noté à Ouessant (29) entre le 1^e octobre et le 18 novembre avec un pic du 11 au 31 octobre. A Hoëdic (56), les mouvements sont circonscrits entre le 13 octobre et le 1^e novembre.

Les mentions de dortoirs les plus importantes concernent 100 individus le 19 janvier à Pacé (35) et le 23 février au marais du Launay/Trévou-Tréguignec (22).

A Hoëdic, on note 1 les 17 mars, 22 et 23 avril.

Les observations relatives aux nicheurs concernent majoritairement les Monts d'Arrée et leurs confins (22-29).

BRUANT MELANOCEPHALE *Emberiza melanocephala*.

1 mâle immature est sur Sein (29) les 26 et 27 mai.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*.

A l'automne, on peut noter 1 le 25 septembre à la pointe de Tal a Grip/Plomodiern (29).

Dans le fond de la baie de Douarnenez (29), des individus sont ensuite notés en automne et en hiver : le 8 décembre à Goulit ar Guer/Plomodiern, le 8 février (15 individus) à Tréguer Vihan/Plonévez-Porzay (29) ; 1 chanteur est 23 mars à Kervijen/Plomodiern.

La première donnée obtenue hors des sites de reproduction concerne 1 individu le 26 octobre à Hoëdic (56) puis 1 est le 28 à Ouessant (29). 18 le 5 novembre à Bourienne/Languieux (22), site où 8 sont le 16 décembre. Non loin de là, 30 sont présents le 21 décembre à Planguenoual (22).

L'espèce est également notée en hiver sur des sites de reproductions classiques : la baie du Mont-Saint-Michel (35), le littoral léonard (29) et la baie d'Audierne (29).

En mars, 1 est le 16 à Loc'h Coziou/Trégunc (29) et 1 chante le 23 à Kerfany/Moëlan-sur-Mer (29). Ce secteur du Sud-Finistère est peu suivi.

En période de reproduction, le Proyer est contacté sur les secteurs suivants :

-le littoral léonard (29) sur les communes de Guissény, Kerlouan, Lampaul-Plouarzel, Plougoulm (nouveau), Plounévez-Lochrist (nouveau) et Saint-Pabu.

-le fond de la baie de Douarnenez (29) sur la commune de Plomodiern.

-la baie d'Audierne (29).

-le littoral du Sud-Est du Finistère sur la commune de Moëlan-sur-Mer.

-la vallée de la Loire (44) sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.

Des indices favorables sont recueillis dans le Finistère avec, en particulier une reproduction réussie sur un secteur abandonné depuis longtemps à Plougoulm.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

Bargain, B., 2004.

Rapport de la station de baguage de la baie d'Audierne. Rapport de contrat Morgane. Bretagne Vivante/DIREN Bretagne/Conseil Général du Finistère, 46 pp.

Bargain, B., Henry, J., 2003.

Rapport de la station de baguage de la baie d'Audierne pour l'année 2002 : Bretagne Vivante/DIREN/Conseil Général du Finistère, 52 pp.

Berthelot, P., 2002.

Note sur un Tadorne de Belon morbihannais en baie de Paimpol. Le Fou, 58 : p. 6.

Berthelot, P., 2003.

La Mouette mélanocéphale de 1984 à 2002 dans les Côtes-d'Armor. Le Fou, 61 : p. 3-8.

Berthelot, P., 2004.

Mise à jour des espèces occasionnelles ou rares dans les Côtes-d'Armor. Le Fou, 62 : p. 7-17.

Blanchard, J.L., 2004.

Le Choucas des bois. Ar Vran Morbihan, 26 : p. 54-55.

Bretagne Vivante-S.E.P.N.B., 2002.

Annuaire des réserves 2002. Bretagne Vivante S.E.P.N.B. 282 pp.

Bretagne Vivante SEPNB, 2002 & 2003.

Bulletins de liaison. Le Grèbion, n° 5 à 11.

Bretagne Vivante-S.E.P.N.B., 2003.

Annuaire des réserves 2003. Bretagne Vivante S.E.P.N.B. 276 pp.

Brié, J.Y., Dugué, H., 2007.

La Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) en Loire-Atlantique. Chronique naturaliste du GNLA. Année 2006 : p. 58-60.

Cadiou, B. (coord.) 2004.

Oiseaux marins nicheurs de Bretagne, 2001-2003. Annuaire des réserves 2003. Bretagne Vivante S.E.P.N.B. : p. 235-250.

Cadiou, B., 2005.

Cap Fréhel 2002-2004 Bilan de trois saisons de reproduction. Le Fou, 67 : p. 14-23.

Cadiou, B., 2006.

Implantation et nidification au sol du Héron cendré *Ardea cinerea* dans l'archipel de Molène. Ornithos, 13-4 : p. 268-270.

Caillat, M., Dugué, H., Leray, G., Gentric, A., Pourreau, J., Julliard, R., Yésou, P., 2005.

Résultats de dix années de baguage de fauvelles paludicoles *Acrocephalus sp.* dans l'estuaire de la Loire. Alauda, 73 (4) : p. 375-388.

Clech, D., Cozic, E., Floté, D., Grémillet, X., Le Roc'h, P., 2004.

Les Cahiers de la surveillance. Bilan 2003. L'oiseau magazine. Rapaces de France, supplément n°6, 20 p..

Conservatoire du Littoral., 2003.

Tentative d'éradication du Surmulot sur l'île Tomé. Le Fou, 59 : p. 9-11.

Cozic, E., 2004.

Nidification du Faucon pèlerin en Bretagne. Bilan 2003. Le Fou, 63 : p. 15-19.

Deceuninck, B., Dronneau, C., Kerautret, L., Mahéo, R., Maillet, N., 2004.

Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 2003. Wetlands International.

Derian, G. (coord.), 2003.

Recensement morbihannais des Grands cormorans *Phalacrocorax carbo*, hiver 2002-2003. Ar Vran Morbihan, 25 : p. 49-52.

Derian, G. (coord.), 2003.

Un recensement diurne le long du Blavet, Grands cormorans *Phalacrocorax carbo* en hiver. Ar Vran Morbihan, 25 : p. 53-54.

Derian, G., 2005.

Suivi d'un groupe colonial de Goélands argentés (*Larus argentatus*) sur les criées de Lorient (1° partie). Ar Vran Morbihan, 28 : p. 46-50.

Derian, G., 2005.

Suivi d'un groupe colonial de Goélands argentés (*Larus argentatus*) sur les criées de Lorient (2° partie). Ar Vran Morbihan, 29 : p. 57-61.

Derian, G., 2006.

Grands cormorans (*Phalacrocorax carbo*) dans la rade de Lorient : présence pluriannuelle et occupation de l'espace. Ar Vran, 17-1 : p. 3-19.

Dubois, Ph.J., Le Maréchal P., Oliosio G., Yésou P., 2000.
Inventaire des Oiseaux de France. Nathan, 397 p..

Eybert, M.C., Bonnet, P., Geslin, T., Hédin, J., 2005.
La reproduction de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en Brière (Loire-Atlantique, France). Alauda, 73 (1) : p. 53-58.

Feuvrier, B., Michelat, D., Vaslin, M., 2005.
Afflux record de Hiboux des marais *Asio flammeus* en France au cours de l'hiver 2002-2003. Ornithos, 12-5 : p. 261-268.

Février, Y., 2003.
Statut nicheur d'une espèce patrimoniale majeure de l'estuaire de la Rance : Le Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* L... Le Fou, 60 : p. 5-23.

Frémont, J.Y. et le C.H.N., 2004.
Les oiseaux rares en France en 2002. Ornithos, 11-2 : p. 49-85.

Frémont, J.Y. et le C.H.N., 2005.
Les oiseaux rares en France en 2003. Ornithos, 12-1 : p. 2-45.

Frémont, J.Y. et le C.H.N., 2006.
Les oiseaux rares en France en 2004. Ornithos, 13-2 : p. 73-113.

Garoche, J., Jamet, M., 2003.
Enquête sur l'avifaune forestière bretonne 2000-2004. Synthèse n°4-Année 2003. G.O.B. : 38 pp.

GNGL, 2004.
Gros plan sur la ...Grande Aigrette (*Egretta alba*). Bulletin du GNGL, 1 : non paginé.

GNGL, 2004.
Répartition et effectifs des grands échassiers nicheurs. Bulletin du GNGL, 3 : non paginé.

GNGL, 2004.
Gros plan sur le ...Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*). Bulletin du GNGL, 4 : non paginé.

GNGL, 2005.
Gros plan sur la ...Sarcelle d'été (*Anas querquedula*). Bulletin du GNGL, 8 : non paginé.

G.O.B., 2002 à 2003.
Bulletins de liaison n°40 à 46.

Groupe Ornithologique Breton, 1997.
Les oiseaux nicheurs de Bretagne, 290 p..

G.O.B. Morbihan, 2003.

Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 2002 au 15 novembre 2002. Ar Vran Morbihan, 25 : p. 4-48.

G.O.B. Morbihan, 2004.

Observations ornithologiques pour la période du 16 novembre 2002 au 15 mars 2003. Ar Vran Morbihan, 26 : p. 4-39.

G.O.B. Morbihan, 2004.

Observations ornithologiques pour la période du 16 mars 2003 au 15 novembre 2003. Ar Vran Morbihan, 27 : p. 4-54.

GEOCA, 2002 & 2003.

La Plume du Fou, notes d'informations n°30 à 34.

Groupe Ornithologique des Côtes d'Armor, 2003.

Actualités ornithologiques du 16 juillet 2002 au 15 novembre 2002. Le Fou, 60 : p. 32-60.

Groupe Ornithologique des Côtes d'Armor, 2003.

Actualités ornithologiques du 16 novembre 2002 au 15 mars 2003. Le Fou, 61 : p. 47-70.

Groupe Ornithologique des Côtes d'Armor, 2004.

Actualités ornithologiques du 16 mars 2003 au 15 juillet 2003. Le Fou, 62 : p. 18-54.

Groupe Ornithologique des Côtes d'Armor, 2004.

Dénombrement de limicoles hivernants – janvier 2003. Le Fou, 62 : p. 45.

Guermeur, Y., à paraître.

Bulletin du Centre ornithologique de l'île d'Ouessant. Données pour 2002.

Guermeur, Y., 2003.

Rapport ornithologique 2003 (condensé). Centre d'Etude du Milieu d'Ouessant/Réserve de la Mer d'Iroise. 17 pp.

Guermeur, Y., J.Y. Monnat, 1980.

Histoire et géographie des oiseaux nicheurs de Bretagne. ARPEGE, 240 pp..

Helsens, B., 2007.

Suivi de l'avifaune sur un secteur péri-urbain : le bois de Champagne à Pacé (35). Le Grèbe, 14 : 11-17.

Henry, J., Ladan, L., Le Pelleter, J.P., Trébern, B., 2003.

Recensement d'oiseaux d'eau. Mi-janvier 2003. 2 pp.

Jamet, M., 2004.

Tentative de nidification du Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) en milieu anthropique. Ar Vran, 15-1 : p. 3-5.

Kerninon, Y., 2004.

Observation d'un Bruant nain *Emberiza pusilla* à Erdeven le 8 mars 2003. Ar Vran Morbihan, 26 : p. 50-51.

- Legrand, R.P., 2002.
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 69 : p. 72-73.
- Legrand, R.P., 2003.
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 70 : p. 72-73.
- Legrand, R.P., 2003.
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 71 : p. 70-72.
- Legrand, R.P., 2003.
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 72 : p. 80-81.
- Legrand, R.P., 2003.
Le coin des branchés. L'oiseau magazine, 73 : p. 70-71.
- Le Caro, F., 2002.
Nidification tardive de Tadornes de Belon dans l'enrochement du Légué/Saint-Brieuc. Le Fou, 58, p. 5.
- Le Névé, A., Kaiser, Y., Iliou, B., 2004.
Synthèse ornithologique hoëdicaise annuelle du 16 juillet 2002 au 15 juillet. 37 pp.
- Le Névé, A. *et al.*, 2004.
Sternes de Bretagne. Observatoire 2003. Contrat Nature « oiseaux marins » 2003-2006. Bretagne Vivante/Conseil Régional de Bretagne/Conseil Général des Côtes-d'Armor/Conseil Général du Finistère, 69 pp.
- Le Névé, A., 2005.
La conservation des sternes en Bretagne : 50 ans d'histoire. Alauda, 73 (4) : p. 389-402.
- Le Provost, M., 2002.
Note sur l'observation d'un Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) à l'étang de l'Ecoublière/Trébédan. Le Fou 58, p. 3-4.
- Le Provost, M., 2005.
Les étangs de Trébédan (F23). Le Fou 66, p. 8-15.
- Le Roy R., 2002.
Notes d'ornithologie en Côtes-d'Armor. Le Fou, 58, p. 15-19.
- Lesaffre, G., 2003.
Note sur l'hivernage du Râle d'eau *Rallus aquaticus* à Trédarzec, Côtes-d'Armor. Le Fou 60, p. 3-4.
- LPO Morbihan/Centre UFCS Vendée, 2003.
Un circaète victime de la tourmente. Rapaces de France, supplément n°5 : p. 5.
- Mahéo, R., 2003.
Avocette *Recurvirostra avosetta* hivernant en France - Saison 2002/2003. Université de Rennes 1.

- Mahéo, R., 2003.
Bernache cravant *Branta bernicla* hivernant en France - Saison 2002/2003. Wetlands International. Station biologique de Bailleron.
- Mahéo, R., 2003.
Limicoles séjournant en France (littoral) : janvier 2003. Wetlands international-ONCFS-Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan.-Station Biologique de Bailleron, 45 p..
- Maoût, J., 2004.
Statut actuel du Grand Corbeau *Corvus corax* dans les Côtes-d'Armor. Le Fou, 62 : p. 3-6.
- Marion, L. (coord.), 2005.
Recensement national des Grands Cormorans hivernant en France durant l'hiver 2004-2005. Laboratoire d'Evolution des Systèmes Naturels et Modifiées, Muséum National d'Histoire Naturelle & Université de Rennes 1.
- Palpant, M., 2003.
Note sur un Pouillot à grands sourcils, trouvé mort dans un jardin. Ar Vran Morbihan, 24 : p. 58.
- Pourreau, J., 2004.
Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernant en Loire-Atlantique -janvier 2001-. Spatule, 11 : p. 5-28.
- Quélenec, T., 2004.
Statut du Grand Corbeau dans l'ouest de la France : Bretagne et Normandie. Ornithos, 11-1 : p. 14-23.
- Recorbet, B., Coord., 1992.
Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIXe siècle à nos jours, 285 p..
- Reeber, S., 2005.
Nidification du Combattant varié *Philomachus pugnax* au lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). Ornithos, 12-6 : p. 328-334.
- Reeber, S., 2004.
Recensement des grèbes, canards et foulques nicheurs. Bulletin du GNGL, 4 : p. 6-8.
- Reeber, S., 2004.
Recensement des grèbes, canards et foulques nicheurs. Bulletin du GNGL, 5 : p. 5-9.
- Reeber, S., 2006.
Les oiseaux du Lac de Grand-Lieu. Société Nationale de Protection de la Nature/Réserve de Naturelle du Lac de Grand-Lieu. 203 pp.
- Reeber, S., 2007.
Enquête nationale sur les espèces allochtones : résultats pour la Loire-Atlantique. Chronique naturaliste du GNLA. Année 2006 : p. 54-57.
- Reeber, S., Latraube, F., 2007.

Synthèse des recensements d'oiseaux d'eau hivernants en Loire-Atlantique. Chronique naturaliste du GNLA. Année 2006 : p. 16-34.

Riegel, J. et les coordinateurs-espèce, 2006.

Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2003 et 2004. Ornithos, 13-4 : p. 209-237.

Triplet, P., Le Dréan-Quénédec'h, S., Mahéo, r., 2006.

Le Bécasseau variable *Calidris alpina* hivernant en France : évolution des effectifs et modalités d'occupation de l'espace. Alauda, 74 (3) : p. 311-322.

Verneau, A. & le Comité d'Homologation, 2007.

Les oiseaux rares en Loire-Atlantique : Observations de 2001 à 2005. Chronique naturaliste du GNLA. Année 2006 : p. 38-48.

Wetlands International, 2004.

Comptages des oiseaux d'eau, janvier 2003, résultats pour le Morbihan. Ar Vran Morbihan, 26 : p. 56-57.

Yésou P., 2005.

L'Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* dans l'ouest de la France : historique et statut actuel. Ornithos, 12-2 : p. 81-83.

Yésou P., Bernard P., Marquis J., Nisser J., 2005.

Biologie de la reproduction de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* sur l'île de Béniguet, Finistère. Alauda, 73 (2) : p. 107-118.

Zucca, M., et le C.M.R., 2005.

Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^e rapport du CMR (janvier 2001-décembre 2002). Ornithos, 12-5 : p. 233-260.

Zucca, M., et le C.M.R., 2007.

Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 3^e rapport du CMR (janvier 2003-décembre 2004). Ornithos, 14-1 : p. 3-33.